herpy

PILEGIFTFRØER

Samaná Poison Frog

Andinobates daleswansoni

Andinobates daleswansoni er en lille, dagaktiv pilegiftfrø på 18-20 mm med knaldrødt hoved og forkrop og brun bagkrop. Den findes kun i tågeskoven på Cordillera Central i Caldas i Colombia. Arten er truet og holdes næppe, så pasningen bygger på levestedets kølige, våde bjergklima.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Ranitomeya daleswansoni* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**18-20 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Bjergskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-22 °C**
Temperatur, nat	**14-17 °C**
Luftfugtighed	**85-100 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**1-2**
Klækning	**16-24 dage**
Larvetid	**108-152 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Truet (EN)**

Hele slægten Andinobates står på CITES liste II, så handel over grænser kræver CITES-tilladelser, og dyrene skal kunne dokumenteres som opdrættede. Arten er vurderet som truet (EN) i naturen.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt viden om pasningen af *Andinobates daleswansoni*, og arten holdes næppe i fangenskab. Pasningen bygger på levestedet: kølig, våd tågeskov med tykt løvlag, mange skjul og bromelier.

TEMPERATUR
Temperaturen er ikke målt i artens levested. 18-22 °C om dagen og 14-17 °C om natten passer til tågeskov i 1.800-2.500 m højde. Arten tåler varme dårligt, og længere tid over 25 °C belaster dyrene.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING
Luftfugtigheden skal være 85-100 %. Sprøjt løv og planter grundigt en eller to gange om dagen med regnvand eller osmosevand, eller brug et tågeanlæg på timer. Bunden skal være fugtig, men ikke stående våd.

VAND OG VANDKVALITET
Arten skal ikke have en vanddel. Dyrene får fugt fra løv, planter og sprøjtning. Haletudserne vokser op i vand i bromeliernes bladkar.

LYS OG UVB
Giv 10-12 timers lys om dagen fra LED, så planterne trives. Tågeskovens underskov er skygget, så lyset skal ikke være stærkt, og dyrene skal kunne søge skygge.

FODER
Andinobates daleswansoni måler kun 18-20 mm og æder små leddyr som springhaler og små bananfluer. Giv foder hver anden dag, drys foderdyrene med kalk de fleste gange og med vitaminer med D3 1 gang om ugen.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten er dagaktiv og lever på jorden i løvlaget, hvor den bruger huller og skjul. Territorieadfærd og kald er ikke dokumenteret. Et par kan holdes sammen i et terrarie på 45 × 45 × 45 cm.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Colombia.