herpy

PILEGIFTFRØER

Tolima Poison Frog

Andinobates dorisswansonae

Andinobates dorisswansonae er en lille, dagaktiv pilegiftfrø på 16-19 mm, sort eller mørkebrun med røde, orange eller gule pletter. Den er kun kendt fra et lille stykke skov i det nordlige Tolima i Colombia. Arten er sårbar og holdes næppe, så pasningen bygger på levestedets kølige, våde bjergklima.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Ranitomeya dorisswansonae* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**16-19 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Bjergskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-22 °C**
Temperatur, nat	**14-17 °C**
Luftfugtighed	**85-100 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**1-2**
Klækning	**16-24 dage**
Larvetid	**108-152 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Hele slægten Andinobates står på CITES liste II, så handel over grænser kræver CITES-tilladelser, og dyrene skal kunne dokumenteres som opdrættede. Arten er vurderet som sårbar (VU) i naturen.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Andinobates dorisswansonae*, og arten holdes næppe i fangenskab. Pasningen bygger på levestedet: kølig, våd bjergskov med tæt kronetag, tykt løvlag og bromelier.
TEMPERATUR	Temperaturen er ikke målt i artens levested. 18-22 °C om dagen og 14-17 °C om natten passer til skov i omkring 1.800 m højde. Arten tåler varme dårligt, og længere tid over 25 °C belaster dyrene. Der skal ikke være nogen varmeplet.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal være 85-100 %. Sprøjt løv og planter grundigt en eller to gange om dagen med regnvand eller osmosevand, eller brug et tågeanlæg på timer. Bunden skal være fugtig, men ikke stående våd.
VAND OG VANDKVALITET	Arten skal ikke have en vanddel. Dyrene får fugt fra løv, planter og sprøjtning. Haletudserne vokser op i vand i bromeliernes bladkar.
LYS OG UVB	Giv 10-12 timers lys om dagen fra LED, så planterne trives. Skoven har tæt kronetag, så lyset skal ikke være stærkt, og dyrene skal kunne søge skygge.
FODER	*Andinobates dorisswansonae* måler kun 16-19 mm og æder små leddyr, i naturen især myrer. Giv springhaler og små bananfluer hver anden dag, og drys foderdyrene med kalk de fleste gange og med vitaminer med D3 1 gang om ugen.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er dagaktiv og lever på jorden i løvlaget. Territorieadfærd er ikke dokumenteret. Et par kan holdes sammen i et terrarie på 45 × 45 × 45 cm. Frøerne bør ikke håndteres, fordi huden er sart.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Colombia.