herpy

PILEGIFTFRØER

Blue-bellied Poison Frog

Andinobates minutus

Andinobates minutus er en af de mindste pilegiftfrøer, kun 13-16 mm fra snude til kloak. Den lever i løvlaget i fugtig lavlandsskov fra det centrale Panama til Colombias stillehavskyst, og hannen bærer haletudserne op i bromelier. Arten indsamles ikke til dyrehandel og holdes næppe, så der findes kun lidt viden om pasningen.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Ranitomeya minuta; Dendrobates minutus; Minyobates minutus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**13-16 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-25 °C**
Temperatur, nat	**19-22 °C**
Luftfugtighed	**80-100 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**1-8**
Larvetid	**60-80 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder**
Yngelpleje	**Bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Hele slægten Andinobates står på CITES liste II, så handel over EU's grænser kræver CITES-tilladelser, og sælgeren bør kunne dokumentere, at dyrene er lovligt opdrættet. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Andinobates minutus*. Pasningen bygger på levestedet: varm, fugtig lavlandsskov med regn det meste af året og et tykt løvlag.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen skal være 22-25 °C og natten 19-22 °C. Tallene er lånt fra *Ranitomeya imitator*, som trives bedst ved 21-24 °C og tåler 18-27 °C. Over 29 °C er farligt, så terrariet må ikke stå i sol eller tæt på en varmekilde.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal være 80-100 %. Sprøjt terrariet 1-2 gange om dagen med regnvand eller osmosevand, så løvet holdes fugtigt, eller brug et regnanlæg på timer. Bunden skal være fugtig, men aldrig stå under vand.
VAND OG VANDKVALITET	De voksne frøer behøver ingen vandskål; de får vand gennem huden fra sprøjtning og det fugtige løv.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og lever i skygge på skovbunden. LED-belysning i omkring 12 timer om dagen er nok til planterne. UVB er ikke nødvendigt; et svagt UVB-lys i Ferguson-zone 1 kan bruges, hvis der er rigeligt med skygge.
FODER	I naturen lever *Andinobates minutus* af mider, myrer, springhaler og insektlarver.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er dagaktiv og holder sig i løvlaget og ved skjulestederne. Hannerne kalder fra faste steder og forsvarer deres område, så holdformen er et par. Flere hanner i samme terrarie giver stress og kampe.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Colombia og Panama.