herpy

PILEGIFTFRØER

Andean Poison Frog

Andinobates opisthomelas

Andinobates opisthomelas er en lille, dagaktiv pilegiftfrø på 15-20 mm fra Colombias Andesbjerge, hvor den lever i løvlaget i fugtig bjergskov i Antioquia og Caldas. Arten er sårbar i naturen, og der findes næsten ingen viden om pasningen.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Ranitomeya opisthomelas; Dendrobates opisthomelas; Minyobates opisthomelas* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-20 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Bjergskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Erfaren**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**1-2**
Klækning	**16-24 dage**
Larvetid	**108-112 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Bærer haletudserne**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 50 × 60 cm** L × B × H til 5 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-25 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**80-100 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Hele slægten Andinobates står på CITES liste II, så handel over EU's grænser kræver CITES-tilladelser, og dyrene skal kunne dokumenteres som opdrættede. Arten er sårbar i naturen, og vildfangne dyr bør ikke anskaffes.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes næsten ingen viden om pasningen af *Andinobates opisthomelas*, og arten holdes næppe. Pasningen bygger på levestedet, den kølige og fugtige bjergskov med løvlag og bromelier, og på nære slægtninge.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen skal være 22-25 °C, og om natten må den gerne falde til 18-21 °C som i bjergskoven. Hold temperaturen under 27 °C.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal være 80-100 % og aldrig under 70 %. Sprøjt to gange om dagen, morgen og eftermiddag, eller brug et tågeanlæg eller regnanlæg med osmosevand eller regnvand.
VAND OG VANDKVALITET	Der er ikke brug for en vandskål; frøerne drikker dråber fra planter og sprøjtevand. Til haletudserne bruges bromelier med vand i bladakslerne eller små plastbægre med 2-3 cm vand.
LYS OG UVB	Lyset er først og fremmest til planterne: plantelys i 10-12 timer om dagen giver dagsrytme og vækst.
FODER	Foderet er små leddyr: springhaler, små bananfluer (*Drosophila melanogaster*) og små isopoder. Nyforvandlede unger tager kun springhaler.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Andinobates opisthomelas* er dagaktiv og lever på jorden, så den holder sig lavt i terrariet, i løvlaget og ved bromelierne.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Colombia.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/pilegiftfroeer/andinobates-opisthomelas