herpy

PILEGIFTFRØER

Andinobates tolimensis

Andinobates tolimensis er en lille, dagaktiv pilegiftfrø på 17-19 mm med brun ryg og metalskinnende gul-bronze hoved. Den er kun kendt fra et lille stykke tågeskov i det nordlige Tolima i Colombia, blev først beskrevet i 2007 og holdes næppe. Pasningen bygger derfor på levestedets kølige, fugtige bjergklima.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Ranitomeya tolimense; Ranitomeya tolimensis* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**17-19 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Bjergskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**19-23 °C**
Temperatur, nat	**15-19 °C**
Luftfugtighed	**85-100 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**1-2**
Klækning	**16-24 dage**
Larvetid	**108-152 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Hele slægten Andinobates står på CITES liste II, så handel over grænser kræver CITES-tilladelser, og dyrene skal kunne dokumenteres som opdrættede. Arten er vurderet som sårbar (VU) i naturen.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt viden om pasningen af *Andinobates tolimensis*, og arten holdes næppe i fangenskab. Pasningen bygger på levestedet: kølig, fugtig tågeskov med tæt løvlag, mos, dødt træ og bromelier.

TEMPERATUR
Temperaturen er ikke målt i artens levested. 19-23 °C om dagen og 15-19 °C om natten passer til tågeskov i omkring 1.800 m højde.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING
Luftfugtigheden skal være 85-100 % hele året, og løvlaget skal være konstant fugtigt. Sprøjt mindst to gange om dagen eller brug et tågeanlæg, og lad overfladerne tørre lidt mellem sprøjtningerne, så der ikke opstår mug.

VAND OG VANDKVALITET
Arten skal ikke have en vanddel. Vandet findes i bromeliernes bladkar, hvor haletudserne vokser op, og det skal skiftes jævnligt, så det ikke bliver grumset. Brug osmosevand, regnvand eller afkloreret postevand.

LYS OG UVB
A. tolimensis lever i en tæt skov med lidt lys ved jorden, så lyset er først og fremmest til planterne. Giv 10-12 timers lys om dagen med LED eller lysstofrør og mørke om natten.

FODER
Foderet er små leddyr: de mindste springhaler og bananfluer (*Drosophila*) og små bænkebidere. Fodr 3-4 gange om ugen, og lad der altid være levende foderdyr i terrariet.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Adfærden i fangenskab er ikke dokumenteret. Frøen lever på skovbunden i skygge og skjuler sig i huller mellem rødderne, i løv og mos. Hannen kalder fra jorden.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Colombia.