herpy

PILEGIFTFRØER

Santander Poison Frog

Andinobates virolinensis

Andinobates virolinensis er en lille, dagaktiv pilegiftfrø på op til 19 mm med skarlagenrødt hoved og forkrop og brun bagkrop. Den findes kun i tågeskoven på den østlige Andeskæde i Colombia. Arten er sårbar i naturen og holdes næppe, så pasningen bygger på levestedets kølige, fugtige bjergklima.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Ranitomeya virolinensis; Dendrobates virolinensis; Minyobates virolinensis* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**19 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Bjergskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**19-23 °C**
Temperatur, nat	**15-19 °C**
Luftfugtighed	**85-100 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**1-2**
Klækning	**16-24 dage**
Larvetid	**108-152 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Hele slægten Andinobates står på CITES liste II, så handel over grænser kræver CITES-tilladelser, og dyrene skal kunne dokumenteres som opdrættede. Arten er vurderet som sårbar (VU) i naturen.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Andinobates virolinensis*, og arten holdes næppe i fangenskab. Pasningen bygger på levestedet: kølig, fugtig tågeskov med tykt løvlag og bromelier.
TEMPERATUR	Temperaturen er ikke målt i artens levested. 19-23 °C om dagen og 15-19 °C om natten passer til tågeskov i 1.300-2.400 m højde.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal være 85-100 % med et fugtigt løvlag hele året.
VAND OG VANDKVALITET	Arten skal ikke have en vanddel. Vandet findes i bromeliernes bladkar, hvor haletudserne vokser op, og det skal skiftes jævnligt, så det ikke bliver grumset. Brug osmosevand, regnvand eller afkloreret postevand.
LYS OG UVB	*A. virolinensis* lever på skovbunden i skygge, så lyset er først og fremmest til planterne. Giv 10-12 timers lys om dagen med LED eller lysstofrør og mørke om natten. Det er ikke dokumenteret, at arten har brug for UVB.
FODER	Foderet er små leddyr: springhaler og bananfluer (*Drosophila*) i den mindste størrelse og små bænkebidere. Fodr 3-4 gange om ugen, og lad der altid være levende foderdyr i terrariet.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Adfærden i fangenskab er ikke dokumenteret. I naturen deler flere voksne samme bromelie, så arten tåler formentlig selskab og kan holdes i par eller en lille gruppe.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Colombia.