herpy

PILEGIFTFRØER

Anthony's Poison Arrow Frog

Epipedobates anthonyi

Epipedobates anthonyi er en lille, rød og stribet pilegiftfrø på 19-27 mm fra det sydvestlige Ecuador og nordvestlige Peru. Det er den frø, der i årtier er solgt som "tricolor", og den er nok den mest holdte og opdrættede pilegiftfrø overhovedet: robust, dristig, kaldelysten og en flittig yngler.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates anthonyi; Phyllobates anthonyi* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**19-27 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-14 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Tørskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**80-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**5-10 mdr.**
Æg pr. lægning	**10-40**
Klækning	**9-14 dage** ved 22-24 °C
Larvetid	**43-89 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Vogter æggene og bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Næsten truet (NT)**

Står på CITES liste II (hele slægten Epipedobates), så handel over landegrænser kræver CITES-papirer, og sælgeren bør kunne dokumentere, at dyrene er lovligt opdrættet. EU-bilaget er ikke aflæst og er derfor udeladt.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et terrarie på mindst 40 × 40 × 40 cm passer til en han og to hunner af *Epipedobates anthonyi*. Større er bedre: 60 × 60 × 40 cm, 80 × 50 × 60 cm eller 100 × 50 × 60 cm passer til grupper på 5-10 dyr.
TEMPERATUR	Hold 22-26 °C om dagen med både køligere og varmere zoner, og lad temperaturen falde til stuetemperatur om natten, omkring 18-21 °C. Arten tåler 18-27 °C, helst omkring 21-24 °C, og over 29 °C er farligt.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal ligge på 80-100 %. Arten tåler ned til 50 % i korte perioder, hvis den har adgang til vand, men lav luftfugtighed uden vand kan hurtigt blive dødelig.
VAND OG VANDKVALITET	Lav et eller flere små vandhuller med omkring 2 cm vand, fx underskåle, drikkeskåle eller halve paranøddeskaller, som frøerne let kommer op af.
LYS OG UVB	Lyset er til planterne. Lysstofrør eller LED-bjælker i omkring 12 timer om dagen er nok, og dagslængden kan gerne variere lidt over året.
FODER	*Epipedobates anthonyi* er lille, men grådig og tager forholdsvis store byttedyr.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Epipedobates anthonyi* er dagaktiv, dristig og ofte fremme, og hannerne kalder med en trille, mest om morgenen og efter sprøjtning.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Ecuador og Peru.