herpy

PILEGIFTFRØER

Darwin Wallace poison frog

Epipedobates darwinwallacei

Epipedobates darwinwallacei er en lille, sort pilegiftfrø på 13-20 mm med orange til gule pletter. Den lever i bjergskoven omkring Mindo i det nordvestlige Ecuador og er truet. Siden 2024 regnes den for et synonym til *Epipedobates espinosai*. Der findes kun lidt viden om pasningen.

Familie: Dendrobatidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**13-20 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**8-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, nat	**18-20 °C**
Luftfugtighed	**80-100 %**
Vand	**Vanddel** dybde 2-5 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**10-30**
Klækning	**9-14 dage**
Larvetid	**42-70 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Vogter æggene og bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Truet (EN)**

Står på CITES liste II (hele slægten Epipedobates), så handel over landegrænser kræver CITES-papirer, og sælgeren bør kunne dokumentere, at dyrene er lovligt opdrættet. EU-bilaget er ikke aflæst og er derfor udeladt.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Epipedobates darwinwallacei*, og arten holdes næppe.
TEMPERATUR	Hold 20-24 °C om dagen og 18-20 °C om natten. Det svarer til den kølige ende af det, der passer til *Epipedobates tricolor* fra samme højde. Det klares normalt med stuetemperatur og belysningen.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal være 80-100 %. Sprøjt flere gange om dagen eller brug et regnanlæg, fx tre gange dagligt i 20-60 sekunder, gerne suppleret med en forstøver.
VAND OG VANDKVALITET	Giv et lille, fast vandparti med 2-5 cm vand og en blid skråning eller rampe, så frøerne let kommer op. I naturen lever arten altid ved langsomt flydende vand, og en lille pumpe uden kraftig strøm holder vandet i bevægelse.
LYS OG UVB	Lyset er til planterne: lysstofrør eller LED-bjælker i omkring 12 timer om dagen. De nærtstående arter trives uden UVB, så det er valgfrit. Vil man give det, så hold sig til Ferguson-zone 1 med rigelig skygge og tæt løv.
FODER	Frøerne får levende, små byttedyr: springhaler og bananfluer (*Drosophila melanogaster*), og voksne tager desuden den større *Drosophila hydei* og nyklækkede fårekyllinger.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*E. darwinwallacei* er dagaktiv og bevæger sig åbent mellem græs og løv. Kaldet ligner meget kaldet hos de brune *E. espinosai* fra lavlandet. Slægtens hanner er territoriale og kalder fra faste pladser.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Ecuador.