herpy

PILEGIFTFRØER

Espinosa Poison Frog

Epipedobates espinosai

Epipedobates espinosai er en lille, dagaktiv pilegiftfrø på 13-20 mm med kobberbrun til mørkerød ryg, hos nogle bestande sort med orange pletter. Den lever i fugtig skov i lavlandet og ved Andesbjergenes fod i det nordvestlige Ecuador. Arten holdes næppe, og der findes kun lidt viden om pasningen.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates espinosai; Phyllobates espinosai; Epipedobates darwinwallacei* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**13-20 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**8-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Erfaren**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**10-30**
Klækning	**9-14 dage**
Larvetid	**42-70 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Vogter æggene og bærer haletudserne**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, nat	**19-22 °C**
Luftfugtighed	**80-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Utilstrækkelige data (DD)**

Står på CITES liste II (hele slægten Epipedobates), så handel over landegrænser kræver CITES-papirer, og sælgeren bør kunne dokumentere, at dyrene er lovligt opdrættet. EU-bilaget er ikke aflæst og er derfor udeladt.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Epipedobates espinosai*, og arten holdes næppe.
TEMPERATUR	Hold 22-26 °C om dagen med lidt køligere og lidt varmere steder i terrariet, og 19-22 °C om natten. Dyr fra Mindo og andre højtliggende steder har det bedst i den kølige ende.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal være 80-100 %. Sprøjt flere gange om dagen eller brug et regnanlæg, fx tre gange dagligt i 20-60 sekunder, gerne suppleret med en forstøver.
VAND OG VANDKVALITET	En flad vandskål med 1-2 cm vand, fx en lav underskål eller en halv paranøddeskal, giver frøerne et sted at drikke og bade og er yngleplads, når hannen skal sætte haletudser af. Skålen skal være let at komme op af.
LYS OG UVB	Lyset er til planterne: lysstofrør eller LED-bjælker i omkring 12 timer om dagen. De nærtstående arter trives uden UVB, så det er valgfrit. Vil man give det, så hold sig til Ferguson-zone 1 med rigelig skygge og tæt løv.
FODER	Frøerne får levende, små byttedyr: springhaler og bananfluer (*Drosophila melanogaster*), og voksne tager desuden den større *Drosophila hydei* og nyklækkede fårekyllinger.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*E. espinosai* er dagaktiv og bevæger sig åbent mellem græs og løv. Slægtens hanner er territoriale og kalder fra faste pladser; de brune og de orangeplettede bestande har næsten ens kald.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Ecuador.