herpy

PILEGIFTFRØER

Machalilla poison frog

Epipedobates machalilla

Epipedobates machalilla er en slank, dæmpet farvet pilegiftfrø på 14-18 mm med brun ryg og en lys stribe langs siden. Den lever kun i lavlandet og de tørre skove i det vestlige Ecuador. Arten holdes næppe, og pasningen bygger på klimaet og de nære slægtninge.

Familie: Dendrobatidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**14-18 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**8-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Tørskov og regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-27 °C**
Temperatur, nat	**19-22 °C**
Luftfugtighed	**80-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**15**
Klækning	**18-22 dage**
Larvetid	**42-70 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Vogter æggene og bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Står på CITES liste II (hele slægten Epipedobates), så handel over landegrænser kræver CITES-papirer, og sælgeren bør kunne dokumentere, at dyrene er lovligt opdrættet. EU-bilaget er ikke aflæst og er derfor udeladt.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Epipedobates machalilla*, og arten holdes næppe.
TEMPERATUR	Hold 22-27 °C om dagen med lidt køligere og lidt varmere steder i terrariet, og 19-22 °C om natten. Arten lever lavere og varmere end *Epipedobates tricolor*, så den øvre del af intervallet passer.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal være 80-100 %. Sprøjt flere gange om dagen eller brug et regnanlæg, fx tre gange dagligt i 20-60 sekunder, så blade og inventar er tørre igen efter omkring en time. Brug regn- eller osmosevand.
VAND OG VANDKVALITET	En lav vandskål med 1-2 cm vand, som frøerne let kommer op af, er nok. Brug regnvand, osmosevand eller afkloreret postevand, og skift det ofte.
LYS OG UVB	Lyset er til planterne: lysstofrør eller LED-bjælker i omkring 12 timer om dagen. De nærtstående arter trives uden UVB, så det er valgfrit. Vil man give det, så hold sig til Ferguson-zone 1 med rigelig skygge og tæt løv.
FODER	*Epipedobates machalilla* er lille og tager små byttedyr: springhaler og bananfluer (*Drosophila melanogaster*), og som voksen også den større *Drosophila hydei* og nyklækkede fårekyllinger.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Hannerne er formentlig territoriale og kalder fra siddepladser på jorden og i løvlaget, ligesom de nære slægtninge. Arten holdes bedst som et par eller en lille gruppe i et terrarie med mange synsbarrierer og gemmesteder.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Ecuador.