herpy

PILEGIFTFRØER

Rio Santiago Poison Frog

Excidobates captivus

Excidobates captivus er en meget lille, dagaktiv pilegiftfrø på 12-17 mm fra grænseområdet mellem Peru og Ecuador. Den er sort med orangerøde pletter i rækker langs ryggen og gule pletter på lemmer og mave, og den lever på skovbunden i fugtig regnskov og bjergskov.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates captivus; Ranitomeya captiva; Adelphobates captivus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**12-17 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**80-100 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**4-8**
Larvetid	**65-75 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Hele slægten Excidobates står på CITES liste II, så handel over EU's grænser kræver CITES-tilladelser, og du bør kunne dokumentere, at dyrene er opdrættede. Arten er sårbar i naturen. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Excidobates captivus*. Arten lever på skovbunden i varm til mild, vedvarende fugtig skov.
TEMPERATUR	Temperaturen på artens lokaliteter er ikke målt. 22-26 °C om dagen og 18-22 °C om natten ligger mellem klimaet i lavlandet og i 800-1200 m højde. Små pilegiftfrøer tåler varme dårligt, så undgå længere perioder over 28 °C.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal være 80-100 %, og bunden skal være fugtig hele året. Sprøjt med osmose- eller regnvand en til to gange dagligt, eller brug et regn- eller tågeanlæg. Sørg for, at luften ikke står stille.
VAND OG VANDKVALITET	En vandskål er ikke nødvendig, fordi frøerne får fugt fra sprøjtningen og det fugtige løvlag. Vandet i bromelier og filmdåser skiftes med friskt osmose- eller regnvand hver uge.
LYS OG UVB	Arten lever i skygge på skovbunden, så lyset skal først og fremmest give plantevækst og en dag på 12 timer. UVB er ikke nødvendigt, men valgfrit.
FODER	*Excidobates captivus* er så lille, at den kun kan tage meget små foderdyr: springhaler, flyveløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*) og de mindste bænkebidere. Fodr voksne og unger dagligt med så meget, som bliver spist.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er dagaktiv, men skjuler sig meget i løvet. Hannen kalder korte, skingre lyde fra skjulte pladser. Den holdes bedst som par, fordi flere dyr sammen kan give strid.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Peru og Ecuador.