herpy

PILEGIFTFRØER

Marañón Poison Frog

Excidobates mysteriosus

Excidobates mysteriosus er en lille, dagaktiv pilegiftfrø på omkring 3 cm fra Cordillera del Cóndor i det nordlige Peru. Den er sort med hvide prikker, yngler i vandfyldte bromelier i gammel bjergskov og er truet i naturen.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates mysteriosus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**3 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, nat	**17-20 °C**
Luftfugtighed	**80-100 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**I bladkar (fx bromelier)**
Kønsmoden	**10-12 mdr.**
Æg pr. lægning	**4-8**
Larvetid	**65-75 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Truet (EN)**

Hele slægten Excidobates står på CITES liste II, så handel over EU's grænser kræver CITES-tilladelser, og du bør kunne dokumentere, at dyrene er opdrættede. Arten er truet i naturen, og vildfangne dyr bør ikke købes. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt viden om pasningen af *Excidobates mysteriosus*. Dyrene lever i fugtig bjergskov tæt på bromelier og klipper, med varme dage og kølige nætter.

TEMPERATUR
Temperaturen på artens lokaliteter er ikke målt. 21-25 °C om dagen og 17-20 °C om natten passer til klimaet i forbjergene. Frøerne tåler varme dårligt, så undgå længere perioder over 27 °C.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING
Luftfugtigheden skal være 80-100 %, og bunden skal være fugtig hele året. Sprøjt med osmose- eller regnvand en til to gange dagligt, eller brug et regn- eller tågeanlæg.

VAND OG VANDKVALITET
En vandskål er ikke nødvendig, fordi frøerne får fugt fra sprøjtningen og fra de vandfyldte bromelier. Vandet i bromelier og filmdåser skiftes med friskt osmose- eller regnvand hver uge.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og lever i skygge under tæt løv, så lyset skal først og fremmest give plantevækst og en dag på 12 timer. UVB er ikke nødvendigt, men valgfrit.

FODER
Excidobates mysteriosus er stor nok til at tage flyveløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*), springhaler og, når dyrene er voksne, *Drosophila hydei*. I naturen spiser arten myrer og små fluer.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten er dagaktiv, og hannen kalder højt og ofte fra planterne og klipperne i terrariet. Den holdes bedst som par, fordi flere dyr sammen kan give strid. Frøerne bør ikke håndteres, fordi de er følsomme over for stress.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Peru.