herpy

PILEGIFTFRØER

Trinidad Poison Frog

Mannophryne trinitatis

Mannophryne trinitatis er en lille, brun og dagaktiv frø på 25-28 mm, som kun findes på Trinidad, hvor den lever ved klare, stenede bække i fugtig skov. Hannen kan blive kulsort, når han kalder, og hunnen har en klar gul strube. Arten holdes næppe, og der findes kun lidt viden om pasningen.

Familie: Aromobatidae Tidligere navn: *Phyllobates trinitatis* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**25-28 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 40 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**23-27 °C**
Temperatur, nat	**20-22 °C**
Luftfugtighed	**80-100 %**
Vand	**Vanddel** dybde 3-5 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**6-13**
Klækning	**21 dage**
Larvetid	**40-50 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Vogter æggene og bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listerne, så der kræves ikke CITES-papirer.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Mannophryne trinitatis*.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen skal være 23-27 °C og natten 20-22 °C. Frøer fra skovbække tåler varme dårligt, så hold temperaturen under 28 °C. Arten har ingen vinterhvile, men i naturen er der en tørrere tid fra januar til maj.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal være 80-100 %. Sprøjt dagligt, så blade og sten er våde. Et tågeanlæg gør det lettere at holde fugten stabil. Sørg for ventilation, så luften ikke bliver stillestående.
VAND OG VANDKVALITET	Arten skal have et fast vandparti med lavt, rent og gerne let strømmende vand, 3-5 cm dybt, med sten og blade. En lille pumpe kan give lidt strøm, og frøerne skal let kunne komme op på land.
LYS OG UVB	UVB er næppe nødvendigt, men en lav dosis (Ferguson-zone 1) er valgfri. Plantelys i 10-12 timer holder mos og bregner i live. Giv skygge med planter og bark, så frøerne kan søge væk fra det skarpe lys.
FODER	Arten skal have små leddyr: små og store bananfluer (*Drosophila melanogaster* og *Drosophila hydei*), springhaler og små isopoder.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Mannophryne trinitatis* er dagaktiv og territorial. Hunnerne forsvarer deres pladser oftere end hannerne, med trusler, brydning og jagt, og de viser den gule strube frem som trussel.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Trinidad og Tobago.