herpy

PILEGIFTFRØER

Polkadot Poison Frog

Oophaga arborea

Oophaga arborea er en lille pilegiftfrø på 20-22 mm, der lever højt oppe i træerne i den fugtige bjergskov i det vestlige Panama. Den er sort eller brun med runde gule pletter, yngler i bromelier 10-16 m over jorden, og haletudserne lever kun af æg fra hunnen. Arten er kritisk truet.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates arboreus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**20-22 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Bjergskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Ekspert**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 80 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, nat	**15-19 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**I bladkar (fx bromelier)**
Æg pr. lægning	**4-8**
Klækning	**14 dage**
Larvetid	**40-50 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Ufrugtbare æg fra hunnen**
Yngelpleje	**Vogter æggene, bærer haletudserne og fodrer haletudserne med æg**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Kritisk truet (CR)**

Hele slægten Oophaga står på CITES liste II, så handel over landegrænser kræver CITES-papirer. Arten er kritisk truet i naturen og har et meget lille udbredelsesområde, så kun opdrættede dyr med dokumentation for oprindelsen bør komme i tale. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og nævnes derfor ikke.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes næsten ingen viden om pasningen af *Oophaga arborea*, og arten er næsten ukendt i fangenskab.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen skal ligge på 20-24 °C, og om natten skal den falde mindst 4-5 °C, til omkring 15-19 °C. Det svarer til tågeskovens klima med en årsmiddeltemperatur omkring 19 °C.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal ligge på 70-80 % om dagen og stige til 100 % om natten. Brug rigelig tåge og regn, og lad terrariet tørre hurtigt af bagefter ved hjælp af en ventilator; stillestående, våd luft er farlig.
VAND OG VANDKVALITET	En vandskål er ikke nødvendig. Frøerne får fugt fra tåge, regn og de vandfyldte bromelier, som også bruges til haletudserne. Vandet i bromelierne skal være rent og friskes op jævnligt med regnvand, osmosevand eller afkloreret vand.
LYS OG UVB	Arten lever højt oppe i kronerne, hvor lyset er stærkere end på skovbunden, men tågen dæmper det.
FODER	Voksne dyr får små, flyveuføre bananfluer, springhaler, nyudklækkede mikrofårekyllinger og markplankton; de samme foderdyr bruges til slægtens øvrige arter. I naturen er foderet små leddyr, og det er derfra, giften kommer.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Oophaga arborea* er en dagaktiv træfrø, der sjældent ses på jorden.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Panama.