herpy

PILEGIFTFRØER

Granular Poison Frog

Oophaga granulifera

Oophaga granulifera er en lille, dagaktiv pilegiftfrø på 19-22 mm fra Stillehavssiden af Costa Rica og det yderste vestlige Panama. Huden er tydeligt kornet, ryggen rød, orange eller olivengrøn, og ben og bug er blågrønne til turkise. Arten lever langs skyggede skovbække, og hunnen fodrer sine haletudser med ubefrugtede æg.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates granuliferus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**19-22 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**6 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**80 × 40 × 40 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, nat	**17-21 °C**
Luftfugtighed	**80-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**12-18 mdr.**
Æg pr. lægning	**2-5**
Klækning	**19-20 dage**
Larvetid	**87-212 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Ufrugtbare æg fra hunnen**
Yngelpleje	**Vogter æggene, bærer haletudserne og fodrer haletudserne med æg**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Hele slægten Oophaga står på CITES liste II, så handel over landegrænser kræver CITES-papirer. Arten er sårbar i naturen, så køb kun opdrættede dyr med dokumentation for oprindelsen. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og nævnes derfor ikke.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Oophaga granulifera*, og arten er sjælden i hobbyen.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen skal ligge på 21-25 °C, og frøerne er mest aktive ved 20-22 °C. Om natten skal temperaturen falde 4-5 °C, til omkring 17-21 °C. Årstidsvariationen er minimal, omkring 1-2 °C.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal ligge på 80-90 %, og 100 % tidligt om morgenen og sidst på dagen, når terrariet sprøjtes. Selv i tørtiden falder fugtigheden langs bækkene sjældent under 80 %, og det er også bunden for terrariet.
VAND OG VANDKVALITET	Et lavt vandfad på 1-2 cm dybde, fx en lav skål nedgravet i bunden eller en vanddel mellem stenene, giver drikkevand og luftfugt. Frøerne er dårlige svømmere, så vandet skal være så lavt, at de kan stå på bunden.
LYS OG UVB	Arten lever i skyggefuld skovbund, så lyset skal først og fremmest dække planternes behov.
FODER	Voksne dyr får små, flyveuføre bananfluer, springhaler, nyudklækkede mikrofårekyllinger, de mindste voksmøllarver og markplankton.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Oophaga granulifera* er sky og lever meget skjult, især i tørtiden, hvor den næsten helt lukker af. Hannerne forsvarer en kaldeplads og kalder mest i regntiden; kampe er sjældne og følger efter lydsignaler.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Costa Rica og Panama.