herpy

PILEGIFTFRØER

Harlequin Poison Frog

Oophaga histrionica

Oophaga histrionica er en dagaktiv pilegiftfrø på 3-4 cm fra regnskoven i det vestlige Colombia, brun til sort med store orange pletter. Haletudserne lever udelukkende af ufrugtbare æg, som hunnen lægger til dem, og det gør arten til en af de sværeste pilegiftfrøer at opdrætte. Den er kritisk truet, og artens afgrænsning blev ændret i 2018.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates histrionicus* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**3-4 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**9 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Ekspert**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**12 mdr.**
Æg pr. lægning	**4-20**
Klækning	**10 dage**
Larvetid	**90 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Ufrugtbare æg fra hunnen**
Yngelpleje	**Vogter æggene, bærer haletudserne og fodrer haletudserne med æg**

PASNING

Min. terrarie	**50 × 50 × 50 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-26 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Kritisk truet (CR)**

Hele slægten Oophaga står på CITES liste II, så handel over landegrænser kræver CITES-papirer. Arten er kritisk truet, og vildfangne dyr er blevet smuglet ud af Colombia, så køb kun dyr med dokumentation for lovligt opdræt og oprindelse. EU-bilaget er ikke aflæst og er derfor udeladt.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Tallene her gælder det gamle, brede kompleks. Et par skal have et regnskovsterrarie på mindst 50 × 50 × 50 cm, og større er bedre. *Oophaga*-arterne kan være territoriale, så hold kun ét par, medmindre terrariet er meget stort.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen skal ligge på 24-26 °C, og om natten sænkes den 5-6 grader, til 18-21 °C. Temperaturen behøver kun at svinge 1-2 grader over året, og der er ingen vinterhvile.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal ligge på 70-80 % midt på dagen og op mod 100 % morgen og aften. Det klares lettest med et regnanlæg og et tågeanlæg på timer. Sprøjt med osmosevand eller regnvand, så ruder og blade ikke får kalkpletter.
VAND OG VANDKVALITET	En lav vandskål med omkring 1 cm vand og en rampe af sten eller mos er nok til de voksne. Brug osmosevand, regnvand eller afkloreret postevand, og skift vandet ofte.
LYS OG UVB	Lyset er først og fremmest til bromelierne og de andre planter. Giv omkring 12 timers lys om dagen med LED eller lysstofrør, der ikke varmer meget.
FODER	*Oophaga histrionica* æder små leddyr, i naturen især myrer, termitter, mider og små biller.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Oophaga histrionica* er dagaktiv. Hannen kalder fra en lav siddeplads, og hannerne forsvarer deres territorier. Hold derfor kun ét par i terrariet. Håndtér ikke frøerne. Huden er følsom, og dyrene bliver let stressede.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Colombia.