herpy

PILEGIFTFRØER

## Lehmann's Poison Frog

# *Oophaga lehmanni*

*Oophaga lehmanni* er en sjælden, dagaktiv pilegiftfrø fra et lille område i det vestlige Colombia, sort eller mørkebrun med brede bånd af rødt, orange eller gult. Den er kritisk truet i naturen, og kun opdrættede dyr hører hjemme i et terrarie. Arten kræver en erfaren holder: den tåler ikke varme, og haletudserne lever udelukkende af ufrugtbare æg fra hunnen.

Familie: Dendrobatidae  Tidligere navn: *Dendrobates lehmanni*  Udgivet 16. november 2026

## SPECIFIKATIONER

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **3-4 cm**<br>snude-kloak-længde |
| Levetid | **4-15 år** |
| Aktiv | **Dag** |
| Levevis | **Jordboende** |
| Biotop | **Regnskov og bjergskov** |
| Hudgift i naturen | **Mild** |
| Hudgift i fangenskab | **Ingen**<br>Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe |
| Sværhedsgrad | **Erfaren** |

### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **60 × 60 × 60 cm**<br>L × B × H til 2 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **22-24 °C** |
| Temperatur, nat | **17-19 °C** |
| Luftfugtighed | **70-100 %** |
| Vand | **Ingen vandskål** |
| UVB | **Valgfri**<br>Ferguson-zone 1 |
| Kost | **Små leddyr (springhaler, bananfluer)** |
| Holdes | **Parvis** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Udvikling | **Haletudserne bæres til vand** |
| Æglægning | **På blade over vand** |
| Æg pr. lægning | **3-10** |
| Klækning | **14-28 dage** |
| Larvetid | **60-90 dage**<br>fra klækning til metamorfose |
| Larvefoder | **Ufrugtbare æg fra hunnen** |
| Yngelpleje | **Vogter æggene, bærer haletudserne og fodrer haletudserne med æg** |

### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendiks II** |
| IUCN | **Kritisk truet (CR)** |

Hele slægten Oophaga står på CITES liste II, så handel over landegrænser kræver CITES-papirer. Indsamling af vilde dyr har været forbudt i Colombia siden 1985, men vildfangne dyr er alligevel solgt i stort omfang. Køb derfor kun dyr med dokumentation for lovligt opdræt og oprindelse.

## Pasning i korte træk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Et par af *O. lehmanni* skal have et terrarie på mindst 60 × 60 × 60 cm (længde × bredde × højde), og større er bedre: de få dokumenterede opdræt er alle lykkedes i større terrarier. |
| **TEMPERATUR** | *O. lehmanni* kommer fra kølig bjergregnskov og er mere følsom over for varme end de fleste pilegiftfrøer. Den trives bedst ved 22-24 °C i dagtimerne, og 24-25 °C bør ikke overskrides, heller ikke i kort tid. |
| **LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING** | Luftfugtigheden skal ligge på 70-100 %: høj morgen og aften, gerne med tåge, så den når op på 100 %, og lidt lavere midt på dagen, ned til omkring 70 %. |
| **VAND OG VANDKVALITET** | Frøerne har ikke brug for en vandskål, fordi fugtigheden dækker deres behov. |
| **LYS OG UVB** | Frøen er dagaktiv og lever i skygge under skovens løvtag. Der er ingen dokumentation for, at arten har brug for UVB, når foderet støves med D3-vitamin, men svag UVB-belysning (Ferguson-zone 1) kan bruges uden skade. |
| **FODER** | *O. lehmanni* spiser kun levende, små leddyr. Hovedfoderet er flyveløse bananfluer, og arten er stor nok til også at tage de større *Drosophila hydei*. |
| **ADFÆRD OG HÅNDTERING** | *O. lehmanni* er dagaktiv og rolig, men hannerne er territoriale og kalder fra faste pladser. Hold arten parvis. Hanner er meget aggressive over for hinanden og undertrykker hinanden, og den underlegne han kan dø af stress. |
| **OPRINDELIG UDBREDELSE** | Colombia. |