herpy

PILEGIFTFRØER

Strawberry Poison Frog

Oophaga pumilio

Oophaga pumilio er en lille, dagaktiv pilegiftfrø på 17-24 mm fra Mellemamerikas regnskove, kendt for sine mange farveformer og en usædvanlig yngelpleje: hunnen fodrer hver haletudse med ufrugtbare æg. Den er fascinerende at følge, men kræver erfaring, små foderdyr og tålmodighed.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates pumilio* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**17-24 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, nat	**19-21 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**10 mdr.**
Æg pr. lægning	**3-5**
Klækning	**10-14 dage**
Larvetid	**42-56 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Ufrugtbare æg fra hunnen**
Yngelpleje	**Vogter æggene, bærer haletudserne og fodrer haletudserne med æg**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Hele slægten Oophaga står på CITES liste II, så international handel kræver CITES-papirer. Køb helst opdrættede dyr, og bed om dokumentation for oprindelsen. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og nævnes derfor ikke.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et par skal have et højt terrarie på mindst ca. 38 liter, og op til fire dyr ca. 76 liter. Et terrarie på 45 × 45 × 45 cm (ca. 90 liter) er derfor et godt minimum til en lille gruppe.

TEMPERATUR
Dagtemperaturen skal ligge på 22-26 °C og natten på 19-21 °C. Yderpunkterne er 20-29 °C, med ca. 24 °C om dagen og et fald til omkring 20 °C om natten.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING
Luftfugtigheden skal være høj, 70-100 %. Sigt efter 70-80 % om dagen og op mod 100 % om natten, fx med sprøjtning fire gange om dagen fra et automatisk anlæg. Et regnanlæg på timer er derfor en stor fordel.

VAND OG VANDKVALITET
En lav vandskål er nok, men vandet må højst være ca. ¾ af frøens højde, i praksis under 1 cm, for arten svømmer dårligt og kan drukne. Brug en flad skål med en rampe af sten eller mos, og skift vandet ofte.

LYS OG UVB
Giv 12 timers lys om dagen, så planterne trives. En LED-plantelampe, der ikke varmer meget, er et godt valg.

FODER
Oophaga pumilio skal have meget små foderdyr, højst ca. 2 mm. Små, flyveløse *Drosophila melanogaster* og springhaler er grundfoderet, suppleret med bladlus, termitter og andre små foderdyr.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Oophaga pumilio er dagaktiv, frimodig og nysgerrig og færdes meget rundt i løvet. Hannerne forsvarer territorier med en summende, fårekyllingeagtig kalden og kan slås med andre hanner.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Nicaragua, Costa Rica og Panama.