herpy

PILEGIFTFRØER

Little Devil Poison Frog

Oophaga sylvatica

Oophaga sylvatica er en af de største pilegiftfrøer i slægten *Oophaga*: en dagaktiv skovbundsfrø på 3-4 cm fra regnskovene i Ecuador og Colombia, kendt for sine mange farveformer i orange, rødt og gult på sort eller brun bund og for sin vedholdende yngelpleje.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates sylvaticus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**3-4 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 60 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**23-26 °C**
Temperatur, nat	**21-23 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**18-24 mdr.**
Æg pr. lægning	**4-20**
Klækning	**10-16 dage**
Larvetid	**75-90 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Ufrugtbare æg fra hunnen**
Yngelpleje	**Vogter æggene, bærer haletudserne og fodrer haletudserne med æg**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Næsten truet (NT)**

Hele slægten Oophaga står på CITES liste II, så handel over landegrænser kræver CITES-papirer. Køb kun opdrættede dyr med dokumentation for oprindelsen. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og nævnes derfor ikke.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et terrarie på mindst 60 × 60 × 60 cm (længde, bredde, højde) passer til ét par. Hannerne er stærkt territoriale, og også hunnerne holder revir og danner rangorden, når der er mange dyr.
TEMPERATUR	*Oophaga sylvatica* kommer fra et lavland med næsten konstant varme, så temperaturen skal holdes stabil: 23-26 °C om dagen og 21-23 °C om natten.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden holdes på 70-80 % i løbet af dagen og går op mod 100 % tidligt om morgenen og sent om aftenen, som når tåge og regn driver ind over skoven. Ved middagstid kan den falde til omkring 70 %.
VAND OG VANDKVALITET	En lav vandskål med 1-2 cm vand og en rampe af sten eller mos er nok til voksne dyr; frøerne er dårlige svømmere, og vandet må højst nå til omkring tre fjerdedele af dyrets højde, når det står.
LYS OG UVB	Lyset skal først og fremmest passe til planterne. Lysstofrør eller LED-lys på omkring 6.500 K giver naturlige farver og god plantevækst; vælg lyskilder med høj virkningsgrad og en reflektor.
FODER	Voksne dyr tager de sædvanlige små foderdyr: springhaler, små og store bananfluer, mikrofårekyllinger, små voksmøllarver, støvlus, ovnfisk og fint sigtet engplankton.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Hannerne er stærkt territoriale og kalder fra morgen til aften; kaldet er kort og højt, omkring fem lyde i sekundet. Rivaliserende hanner kalder i kap, rykker frem og trækker sig tilbage og kan ende i brydekampe.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Ecuador og Colombia.