herpy

PILEGIFTFRØER

Vicente's Poison Frog

Oophaga vicentei

Oophaga vicentei er en lille, farvestærk og dagaktiv pilegiftfrø på op til 24 mm, som kun findes i det centrale Panama. Farverne varierer fra gul og rød til blå, grå og grøn, ofte med et sort netmønster. Arten er truet i naturen, og der findes kun lidt viden om pasningen.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates vicentei* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**12-24 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, nat	**19-21 °C**
Luftfugtighed	**80-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**I bladkar (fx bromelier)**
Æg pr. lægning	**1-12**
Klækning	**10-14 dage**
Larvetid	**42-56 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Ufrugtbare æg fra hunnen**
Yngelpleje	**Vogter æggene, bærer haletudserne og fodrer haletudserne med æg**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Truet (EN)**

Hele slægten Oophaga står på CITES liste II, så international handel kræver CITES-papirer. Arten er truet i naturen (IUCN: EN), så køb kun dokumenteret opdrættede dyr.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Oophaga vicentei*.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen skal være 22-26 °C og natten 19-21 °C. Frøerne tåler varme dårligt, så undgå længere perioder over 28 °C. Placér terrariet køligt, sørg for ventilation, og brug lamper, der ikke varmer. Arten har ingen vinterhvile.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal være 80-100 % og aldrig under 70 %. Sprøjt terrariet grundigt en til to gange om dagen med vand uden kalk og klor (regnvand eller osmosevand), så blade og bromelier er våde.
VAND OG VANDKVALITET	En flad vandskål med 1-2 cm vand er nok, for frøerne er dårlige svømmere. Hold den ren, og skift vandet hver dag eller hver anden dag.
LYS OG UVB	UVB er næppe nødvendigt, men lidt UVB (Ferguson-zone 1) skader ikke og er valgfrit. Plantelys i 10-12 timer om dagen holder planterne i live, og natten skal være mørk. Lamperne må ikke varme terrariet op over 26 °C.
FODER	Arten skal have meget små foderdyr. Grundfoderet er små, flyveløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*) og springhaler, suppleret med bladlus, små termitter og små isopoder.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Oophaga vicentei* er dagaktiv. Hannen kalder fra et sted højt oppe og finder ynglestedet. Hunner kan æde andre hunners æg, så et par er det sikreste. Frøerne bør ikke håndteres, fordi huden er tynd og følsom.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Panama.