herpy

PILEGIFTFRØER

Kokoe Poison Frog

Phyllobates aurotaenia

Phyllobates aurotaenia er en dagaktiv pilegiftfrø på 3-4 cm fra Colombias stillehavskyst, sort med to grønne til gyldne striber langs ryggen. Vilde dyr bærer en dødelig hudgift, men opdrættede dyr er ugiftige. Arten er dristig, kalder højt og er let at få til at yngle.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates aurotaenia* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**3-4 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift i naturen	**Kraftig**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-24 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**8-10 mdr.**
Æg pr. lægning	**8-28**
Larvetid	**60-80 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder**
Yngelpleje	**Bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Hele slægten Phyllobates står på CITES liste II, så handel over landegrænser kræver CITES-papirer, og sælgeren bør kunne dokumentere, at dyrene er opdrættet i fangenskab. EU-bilaget er ikke aflæst og er derfor udeladt.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et par eller en lille gruppe *Phyllobates aurotaenia* skal have et regnskovsterrarie på mindst 60 × 45 × 45 cm til op til 4 voksne dyr.
TEMPERATUR	*Phyllobates aurotaenia* trives bedst køligt. Dagtemperaturen skal ligge på 21-24 °C, og om natten sænkes den til 18-21 °C. Arten tåler 18-27 °C, men over 27 °C er farligt, og slægten er kendt for at tåle varme dårligt.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal ligge på 70-100 %. Arten tåler kortvarigt ned til 50 %, hvis den har adgang til vand, men lav fugt uden vand kan hurtigt blive dødelig.
VAND OG VANDKVALITET	En lav vandskål med 1-2 cm vand og en sten eller en skrå kant, så frøerne let kommer op, er nok.
LYS OG UVB	Lyset er først og fremmest til planterne. Lysstofrør eller LED-lys på omkring 6.500 K giver naturlige farver og god plantevækst, og omkring 12 timers lys om dagen er almindeligt.
FODER	*Phyllobates aurotaenia* æder små leddyr. Unger tager vingeløse *Drosophila melanogaster*, mens voksne dyr gerne æder større foderdyr som *Drosophila hydei* og helt små fårekyllinger.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Phyllobates aurotaenia* er dagaktiv og dristig, men sky som ung.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Colombia.