herpy

PILEGIFTFRØER

## Black-legged Poison Dart Frog

# *Phyllobates bicolor*

*Phyllobates bicolor* er en gul til orange pilegiftfrø på 3-5 cm fra regnskoven i det vestlige Colombia, ofte med sorte eller grønlige ben. I naturen er den et af de giftigste dyr, man kender, men opdrættede dyr er ugiftige. Den er dristig, nysgerrig og næsten altid fremme, og den yngler villigt i terrariet.

Familie: Dendrobatidae  Udgivet 15. november 2026

### SPECIFIKATIONER

#### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **3-5 cm**<br>snude-kloak-længde |
| Vægt | **4,5 g** |
| Levetid | **6-20 år** |
| Aktiv | **Dag** |
| Levevis | **Jordboende** |
| Biotop | **Regnskov** |
| Hudgift i naturen | **Kraftig** |
| Hudgift i fangenskab | **Ingen**<br>Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe |
| Sværhedsgrad | **Øvet** |

#### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **50 × 50 × 50 cm**<br>L × B × H til 2 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **21-25 °C** |
| Temperatur, nat | **18-21 °C** |
| Luftfugtighed | **70-100 %** |
| Vand | **Vandskål**<br>dybde 1-2 cm |
| UVB | **Valgfri**<br>Ferguson-zone 1 |
| Kost | **Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)** |
| Holdes | **Parvis eller i gruppe** |

#### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Udvikling | **Haletudserne bæres til vand** |
| Æglægning | **På jorden** |
| Kønsmoden | **12 mdr.** |
| Æg pr. lægning | **4-30** |
| Klækning | **13-14 dage**<br>ved 21-23 °C |
| Larvetid | **21-60 dage**<br>fra klækning til metamorfose |
| Larvefoder | **Færdigfoder** |
| Yngelpleje | **Vogter æggene og bærer haletudserne** |

#### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendiks II** |
| IUCN | **Truet (EN)** |

Står på CITES liste II (hele slægten Phyllobates), så handel over landegrænser kræver CITES-papirer, og sælgeren bør kunne dokumentere, at dyrene er lovligt opdrættet. EU-bilaget er ikke aflæst og er derfor udeladt.

## Pasning i korte træk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Et par *Phyllobates bicolor* skal have et regnskovsterrarie på mindst 50 × 50 × 50 cm. |
| **TEMPERATUR** | Angivelserne for dagtemperaturen svinger fra 21-23 °C til 23-26 °C, så 21-25 °C er en sikker ramme. Om natten sænkes temperaturen 3-4 grader, til 18-21 °C. |
| **LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING** | Luftfugtigheden skal ligge på 70-80 % midt på dagen og op mod 100 % morgen og aften. Et regnanlæg og et tågeanlæg på timer gør det lettest, og tågen får tydeligt frøerne til at kalde og bevæge sig. |
| **VAND OG VANDKVALITET** | Arten sætter pris på en vandflade i terrariet. Giv en eller flere små vandskåle med 1-2 cm vand, som dyrene let kommer op af, eller et lille vandparti foran ruden med afløb, så vandet let kan skiftes. |
| **LYS OG UVB** | Lyset er først og fremmest til planterne. Lysstofrør eller LED i omkring 12 timer om dagen er nok. |
| **FODER** | *Phyllobates bicolor* foretrækker små foderdyr på højst omkring 3 mm. |
| **ADFÆRD OG HÅNDTERING** | *Phyllobates bicolor* er dagaktiv, meget aktiv og nysgerrig og næsten altid til at se. Hannerne kalder højt med trillende, summende toner, nogle gange i flere dage ad gangen. |
| **OPRINDELIG UDBREDELSE** | Colombia. |