herpy

PILEGIFTFRØER

Lovely Poison Frog

Phyllobates lugubris

Phyllobates lugubris er en lille, sort pilegiftfrø på 19-24 mm med to gule, gyldne eller orange striber langs ryggen. Den lever på skovbunden i lavlandsregnskoven på Mellemamerikas caribiske side, fra Nicaragua til Panama. Den ses af og til i handlen, men der findes kun lidt viden om pasningen.

Familie: Dendrobatidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**19-24 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**80-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-3 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**7-21**
Larvetid	**45-80 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder**
Yngelpleje	**Vogter æggene og bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Hele slægten Phyllobates står på CITES liste II, så handel over landegrænser kræver CITES-papirer, og sælgeren bør kunne dokumentere, at dyrene er lovligt opdrættet. EU-bilaget er ikke aflæst og er derfor udeladt.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Phyllobates lugubris*.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen skal være 21-25 °C og natten 18-21 °C, som for *Phyllobates vittatus*. Pilegiftfrøer er meget følsomme for varme: over 27 °C bør undgås, og flere timer omkring 29 °C kan være dødeligt.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal være 80-100 %, og jorden og løvlaget skal altid være fugtige. Sprøjt terrariet grundigt 1-2 gange om dagen med regnvand, osmosevand eller afkloreret vand, eller brug et regn- eller tågeanlæg.
VAND OG VANDKVALITET	De voksne frøer drikker ikke, men optager vand gennem huden, og en lav vandskål med 1-3 cm vand er nok. *Phyllobates vittatus* sætter pris på et lille vandparti, og i naturen bæres haletudserne til vandløb.
LYS OG UVB	Arten lever på skovbunden, hvor lyset er dæmpet, og UVB er ikke dokumenteret som nødvendigt. En svag UVB-lampe i Ferguson-zone 1 er valgfri; giv da altid skygge.
FODER	*Phyllobates lugubris* æder i naturen mest myrer og mider. I terrariet gives små leddyr: vingeløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*), springhaler, små isopoder og nyklækkede fårekyllinger. Byttet skal være under 3 mm langt.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er dagaktiv og lever skjult mellem løv og planter. Hannerne kalder fra skjulte pladser og forsvarer deres område mod andre hanner, så flere hanner i samme terrarie kan give stress.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Nicaragua, Costa Rica og Panama.