herpy

PILEGIFTFRØER

Golden Poison Frog

Phyllobates terribilis

Phyllobates terribilis er den største af pilegiftfrøerne, 4-5 cm, og i naturen et af de giftigste dyr, man kender. Den lever kun i et lille stykke regnskov ved Colombias stillehavskyst. Opdrættede dyr er praktisk talt ugiftige, dristige og altid fremme, og arten er blevet en af terraristikkens mest holdte pilegiftfrøer.

Familie: Dendrobatidae Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**4-5 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**8-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift i naturen	**Kraftig**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 50 × 50 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**16-20 mdr.**
Æg pr. lægning	**10-30**
Klækning	**10-25 dage** ved 22-24 °C
Larvetid	**30-60 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder**
Yngelpleje	**Vogter æggene og bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Truet (EN)**

Står på CITES liste II (hele slægten Phyllobates), så handel over landegrænser kræver CITES-papirer, og sælgeren bør kunne dokumentere, at dyrene er lovligt opdrættet. EU-bilaget er ikke aflæst og er derfor udeladt.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et par af *Phyllobates terribilis* skal have et terrarie på mindst 50 × 50 × 50 cm, gerne 60 cm i alle mål, og 60 × 50 × 80 cm eller 80 × 50 × 80 cm til grupper på 5-10 dyr.
TEMPERATUR	Angivelserne svinger: 16-27 °C med omkring 21-24 °C som det ideelle, 18-24 °C om dagen og ned til 16 °C om natten og aldrig over 27 °C, eller 22-24 °C nede ved bunden og 30-32 °C i de højeste, mest udsatte zoner under en lille spot på fx 35 W, men ikke over 30 °C i hele terrariet.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal være høj, 70-100 %, men bunden må ikke blive sumpet. Et regnanlæg er det letteste, fx med tre sprøjtninger om dagen på 20-60 sekunder, afhængigt af dyserne.
VAND OG VANDKVALITET	Giv en eller flere små vandskåle med omkring 2 cm vand, fx underskåle eller halve paranøddeskaller, som dyrene let kommer op af.
LYS OG UVB	Lyset er først og fremmest til planterne. Lysstofrør eller LED-bjælker i omkring 12 timer om dagen er nok, og dagslængden kan gerne variere lidt over året.
FODER	*Phyllobates terribilis* tager større bytte end de fleste pilegiftfrøer. I naturen er myrer hovedføden, men den tager mange slags små leddyr.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Phyllobates terribilis* er dagaktiv, dristig og nysgerrig og er fremme det meste af dagen med en kort pause midt på dagen. Hannerne kalder med en blød, fuglelignende trille, især efter sprøjtning.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Colombia.