herpy

PILEGIFTFRØER

Golfodulcean Poison Frog

Phyllobates vittatus

Phyllobates vittatus er en sort pilegiftfrø med to klare orange eller gule striber ned langs ryggen og blåmarmorerede ben. Den lever kun i lavlandsskoven omkring Golfo Dulce i det sydvestlige Costa Rica. I terrariet er den dagaktiv, kaldelysten og en flittig yngler, og hannen bærer selv haletudserne til vand.

Familie: Dendrobatidae Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**3-4 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**8-10 mdr.**
Æg pr. lægning	**7-21**
Larvetid	**45-80 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder**
Yngelpleje	**Vogter æggene og bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Står på CITES liste II (hele slægten Phyllobates), så handel over landegrænser kræver CITES-papirer, og sælgeren bør kunne dokumentere, at dyrene er lovligt opdrættet. EU-bilaget er ikke aflæst og er derfor udeladt.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et terrarie på ca. 60 × 45 × 45 cm passer til 2-4 dyr af *Phyllobates vittatus*, og som tommelfingerregel regnes der med omkring 20-40 liter pr. voksen frø.

TEMPERATUR
Hold *Phyllobates vittatus* mellem 16 og 27 °C, helst omkring 21-24 °C. En dagtemperatur på 21-25 °C og et fald til 18-21 °C om natten passer de fleste stuer.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING
Luftfugtigheden skal ligge på 70-100 %. Arten tåler ned til 50 % i korte perioder, hvis den har adgang til vand, men lav luftfugtighed uden vand kan hurtigt blive dødelig.

VAND OG VANDKVALITET
Giv en lav vandskål eller et lille vandparti med 1-2 cm vand og en sten eller et stykke bark, så dyrene let kommer op. Frøerne fugter sig i vandet, og hannen kan bruge det til at afsætte haletudser.

LYS OG UVB
Lyset er til planterne. LED-bjælker eller lysstofrør på et tænd-sluk-ur i 10-12 timer om dagen er nok, og natten skal være mørk. Giv skygge, og stil aldrig terrariet i direkte sol.

FODER
Phyllobates vittatus er usædvanlig, fordi voksne dyr tager større bytte end de fleste pilegiftfrøer.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Phyllobates vittatus er dagaktiv, og hannerne har en høj, trillende kaldestemme. Arten kan holdes i par eller grupper.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Costa Rica.