herpy

PILEGIFTFRØER

Amazonian Poison Frog

Ranitomeya amazonica

Ranitomeya amazonica er en bitte lille, dagaktiv pilegiftfrø på 16-19 mm fra Amazonas omkring Iquitos i Peru og Leticia i Colombia. Den er sort med røde, orange eller gule striber og blågrå marmorering på benene, yngler i bromelier og regnes for en af de letteste små Ranitomeya at holde og yngle.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates amazonicus* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**16-19 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri**
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**I bladkar (fx bromelier)**
Kønsmoden	**5-8 mdr.**
Æg pr. lægning	**2-8**
Klækning	**10-14 dage**
Larvetid	**60-80 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder og andre haletudser**
Yngelpleje	**Bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Hele slægten Ranitomeya står på CITES liste II, så handel over EU's grænser kræver CITES-tilladelser. Køb kun dyr, der kan dokumenteres som opdrættede, og gem papirerne. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Et par eller en trio *Ranitomeya amazonica* kan holdes i et terrarie på 40 × 40 × 40 cm. Angivelserne svinger fra 30 × 30 × 30 cm til 2-3 voksne til ca. 45 × 45 × 45 cm til 1-3 dyr.

TEMPERATUR

Hold terrariet på 21-26 °C om dagen og 18-21 °C om natten. Arten tåler 18-27 °C, trives fint omkring 21-24 °C og er mest aktiv og yngler bedst ved 24-26 °C. Over 27 °C bliver frøerne stressede, og 29 °C kan være dødeligt.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING

Luftfugtigheden skal ligge på 70-100 %, helst 80-100 %. Sprøjt hver dag, gerne morgen og aften, så fugten er tæt på 100 % efter sprøjtningen og falder til omkring 70-75 % midt på dagen. Brug osmosevand eller regnvand.

VAND OG VANDKVALITET

Ranitomeya amazonica svømmer dårligt, så vandet skal være lavt og let at komme op af. Brug en lav vandskål eller et lille vandparti med 1-2 cm vand, så den mindste frø kan sidde med hoved og overkrop over vandet.

LYS OG UVB

Frøerne er dagaktive og lever i skovens skygge. Lyset er først og fremmest til planterne: giv 12-14 timer LED-plantelys om dagen. *Ranitomeya amazonica* har ikke noget kendt behov for UVB, så UVB er valgfrit.

FODER

Ranitomeya amazonica er så lille, at den kun kan tage små foderdyr. Unger og voksne tager flyveløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*), og store voksne kan også tage *D. hydei* og nyklækkede fårekyllinger.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Ranitomeya amazonica er dagaktiv, men ofte sky, og især unge dyr gemmer sig meget. I et tæt beplantet terrarie med mange visne blade kommer frøerne mere frem.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Peru og Colombia.