herpy

PILEGIFTFRØER

Blessed Poison Frog

Ranitomeya benedicta

Ranitomeya benedicta er en lille, dagaktiv pilegiftfrø på 16-20 mm fra lavlandsskoven i det nordlige Peru. Det klart røde hoved og den sorte krop med blåt netmønster gør den til en af de mest farvestrålende i slægten. Indtil 2008 blev den regnet for en underart af *Ranitomeya fantastica*. I naturen er den sårbar, men opdrættede dyr yngler villigt i et godt indrettet terrarie.

Familie: Dendrobatidae Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**16-20 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri**
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**2-6**
Klækning	**10-14 dage**
Larvetid	**60-114 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Vogter æggene og bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Hele slægten Ranitomeya står på CITES liste II, så handel over EU's grænser kræver CITES-tilladelser, og du bør kunne dokumentere, at dyrene er opdrættede. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et par *R. benedicta* kan holdes i et terrarie på 40 × 40 × 40 cm.
TEMPERATUR	Hold terrariet på 21-26 °C om dagen og 18-22 °C om natten. Arten trives bedst omkring 21-24 °C og tåler kortvarigt 18-27 °C.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal ligge på 70-100 %. En god rytme er næsten 100 % morgen og aften og 70-75 % midt på dagen, så terrariet tørrer lidt op mellem sprøjtningerne.
VAND OG VANDKVALITET	En lav vandskål eller en bromelie med vand i bladhjørnerne er nok.
LYS OG UVB	*R. benedicta* er dagaktiv, og lyset er først og fremmest til planterne. Giv 12-14 timers lys om dagen med lysstofrør eller LED på timer, hele året rundt, og mørke om natten. Det svarer til dagslængden i troperne.
FODER	Grundfoderet er små levende leddyr. Dyr i alle aldre tager flyveløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*), og voksne kan også tage den større *D. hydei*.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*R. benedicta* er dagaktiv og kan være lidt sky, især som ung, men i et tæt beplantet terrarie med gemmesteder ses voksne dyr meget. Hannen sidder frit fremme og kalder.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Peru.