herpy

PILEGIFTFRØER

## Red-headed Poison Frog

# *Ranitomeya fantastica*

*Ranitomeya fantastica* er en dagaktiv pilegiftfrø på 20-25 mm fra det nordlige Peru og en af de største i slægten. Den er usædvanlig variabel, og mange former har et lysende orange, rødt eller gult hoved over en sort krop med lyse tegninger. Frøerne er lynhurtige og ofte sky, æggene er svære at finde, og arten egner sig bedst til en holder, der allerede har erfaring med pilegiftfrøer.

Familie: Dendrobatidae  Tidligere navn: *Dendrobates fantasticus*  Udgivet 15. november 2026

## SPECIFIKATIONER

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **20-25 mm**<br>snude-kloak-længde |
| Levetid | **5-10 år** |
| Aktiv | **Dag** |
| Levevis | **Træboende og jordboende** |
| Biotop | **Regnskov** |
| Hudgift i naturen | **Mild** |
| Hudgift i fangenskab | **Ingen**<br>Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe |
| Sværhedsgrad | **Øvet** |

### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **40 × 40 × 40 cm**<br>L × B × H til 3 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **21-26 °C** |
| Temperatur, nat | **18-22 °C** |
| Luftfugtighed | **70-100 %** |
| Vand | **Vandskål**<br>dybde 1-2 cm |
| UVB | **Valgfri** |
| Kost | **Små leddyr (springhaler, bananfluer)** |
| Holdes | **Parvis eller i gruppe** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Udvikling | **Haletudserne bæres til vand** |
| Æglægning | **På jorden** |
| Æg pr. lægning | **3-8** |
| Klækning | **10-14 dage** |
| Larvetid | **60-80 dage**<br>fra klækning til metamorfose |
| Larvefoder | **Alger/planter og færdigfoder** |
| Yngelpleje | **Vogter æggene og bærer haletudserne** |

### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendiks II** |
| IUCN | **Sårbar (VU)** |

Hele slægten Ranitomeya står på CITES liste II, så handel over EU's grænser kræver CITES-tilladelser, og du bør kunne dokumentere, at dyrene er opdrættede. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

## Pasning i korte træk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Et par eller en trio *R. fantastica* kan holdes i et terrarie på 40 × 40 × 40 cm. Angivelserne går helt ned til 30 × 30 × 30 cm til 2-3 dyr, men større er bedre. Mange former er træboende og bruger højden. |
| **TEMPERATUR** | Hold terrariet på 21-26 °C om dagen og 18-22 °C om natten. Arten trives bedst omkring 21 °C og tåler 18-27 °C, mens temperaturer over 29 °C kan være dødelige. |
| **LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING** | Luftfugtigheden skal ligge på 70-100 %. En god rytme er næsten 100 % morgen og aften og 70-75 % midt på dagen, så terrariet får lov at tørre lidt op mellem sprøjtningerne. |
| **VAND OG VANDKVALITET** | En lav vandskål eller en bromelie med vand i bladhjørnerne er nok. |
| **LYS OG UVB** | *R. fantastica* er dagaktiv, og lyset er først og fremmest til planterne. Giv 12-14 timers lys om dagen og mørke om natten. Det er ikke dokumenteret, at arten har brug for UVB. |
| **FODER** | Grundfoderet er små leddyr. Unger og voksne tager flyveløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*), og store voksne kan også tage den større *D. hydei*. |
| **ADFÆRD OG HÅNDTERING** | *R. fantastica* er dagaktiv, lynhurtig og ofte sky, men mange dyr bliver dristigere, når de yngler. Man ser mest til dem i et tæt beplantet terrarie med gemmesteder. |
| **OPRINDELIG UDBREDELSE** | Peru. |