herpy

PILEGIFTFRØER

Tahuayo Poison Frog

Ranitomeya flavovittata

Ranitomeya flavovittata er en af de mindste arter i slægten: kun 15-17 mm fra snude til kloak. Den er skarpt gul med sort tegning, brune ben og lyseblå bug og kommer fra regnskoven nær Iquitos i det nordøstlige Peru. Den er dagaktiv og lidt sky, yngler villigt i filmdåser og bromelier og er et godt valg for en holder med lidt erfaring.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates flavovittatus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-17 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**I bladkar (fx bromelier)**
Kønsmoden	**5-8 mdr.**
Æg pr. lægning	**2-6**
Klækning	**10-14 dage**
Larvetid	**60-80 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder og ufrugtbare æg fra hunnen**
Yngelpleje	**Bærer haletudserne og fodrer haletudserne med æg**

PASNING

Min. terrarie	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri**
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Hele slægten Ranitomeya står på CITES liste II, så handel over EU's grænser kræver CITES-tilladelser, og du bør kunne dokumentere, at dyrene er opdrættede. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Et par *R. flavovittata* kan holdes i et terrarie på 30 × 30 × 45 cm, og samme størrelse kan rumme 2-3 voksne dyr. Andre angivelser anbefaler 45 × 45 × 45 cm til 1-3 frøer og omkring 20 liter pr. frø i en gruppe.

TEMPERATUR

Hold terrariet på 21-26 °C om dagen og 18-21 °C om natten. Arten trives bedst omkring 21-24 °C og tåler 18-27 °C. Nattemperaturen er ikke angivet særskilt for arten og er lånt fra beslægtede arter.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING

Luftfugtigheden skal være 70-100 %; nogle angivelser foretrækker 80-100 %. Arten kan kortvarigt klare omkring 50 %, hvis den har adgang til rent vand, men det er en nødløsning og kan være dødeligt, hvis det varer ved.

VAND OG VANDKVALITET

Giv frøerne en lav vandskål eller et lille vandparti, og hold vandet så lavt, at den mindste frø kan sidde med hoved og overkrop over vandet: arten svømmer dårligt. Vanddybden bør være 1-2 cm.

LYS OG UVB

Frøerne er dagaktive og lever i regnskovens skygge. Lyset er først og fremmest til planterne: LED-lys 12-14 timer om dagen er passende. Det er ikke dokumenteret, at arten har brug for UVB, og det bruges normalt ikke.

FODER

R. flavovittata er så lille, at den kun kan tage små foderdyr. Unger og de fleste voksne æder flyveløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*), og store voksne kan også tage *D. hydei* og nyklækkede fårekyllinger.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

R. flavovittata er dagaktiv, hurtig og lidt sky. Frøerne bliver dristigere, hvis terrariet er tæt beplantet og har mange skjul, og de vænner sig til dig, hvis du ser på dem gennem glasset. Hannerne kalder fra åbne pladser.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Peru.