herpy

PILEGIFTFRØER

Mimic Poison Frog

Ranitomeya imitator

Ranitomeya imitator er en lille, dagaktiv pilegiftfrø på 16-20 mm fra det nordlige Peru. Hver lokal form efterligner en anden giftig frø i samme område, og arten var den første padde, hvor man påviste ægte monogami: parret passer ungerne sammen, og hunnen fodrer hver haletudse med ufrugtbare æg.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates imitator; Ranitomeya intermedia* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**16-20 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri**
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**5-8 mdr.**
Æg pr. lægning	**1-8**
Klækning	**7-16 dage**
Larvetid	**60-80 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder og ufrugtbare æg fra hunnen**
Yngelpleje	**Vogter æggene, bærer haletudserne og fodrer haletudserne med æg**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Hele slægten Ranitomeya står på CITES liste II, så handel over EU's grænser kræver CITES-tilladelser, og du bør kunne dokumentere, at dyrene er opdrættede. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et par *R. imitator* kan holdes i et terrarie på 45 × 45 × 45 cm. Det mål passer til 1-3 dyr.

TEMPERATUR
Hold terrariet på 21-26 °C om dagen og 18-22 °C om natten. Arten tåler 18-27 °C, men trives bedst omkring 21-24 °C, og temperaturer over 29 °C er farlige.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING
Luftfugtigheden skal ligge på 70-100 %. Sigt efter næsten 100 % morgen og aften og 70-75 % midt på dagen, så terrariet får lov at tørre lidt op mellem sprøjtningerne; andre angivelser lyder på 80-100 %.

VAND OG VANDKVALITET
En lav vandskål eller en bromelie med vand i bladhjørnerne er nok. Vandet må ikke være dybere, end at den mindste frø kan sidde i det med hoved og overkrop over vandet, for arten svømmer dårligt. 1-2 cm er et passende niveau.

LYS OG UVB
R. imitator er dagaktiv og lever i skyggen under skovens tag. Lyset er først og fremmest til planterne. Giv LED-lys 12-14 timer om dagen, fx kl. 8-20.

FODER
Grundfoderet er små leddyr: flyveløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*), springhaler og små bænkebidere. Store voksne dyr kan også tage den større *D. hydei*.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
R. imitator er dristig og dagaktiv og ses ofte frit fremme i terrariet. Hannen kalder fra faste pladser, og begge køn forsvarer parrets territorium mod artsfæller.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Peru.