herpy

PILEGIFTFRØER

Red-backed Poison Frog

Ranitomeya reticulata

Ranitomeya reticulata er en af de mindste pilegiftfrøer: kun 13-17 mm, med kobberrød til orange ryg og blågrå ben med sort netmønster. Den lever i lavlandsskoven i Amazonas i det nordøstlige Peru og det østlige Ecuador. I terrariet er den dristig og livlig, men krævende, fordi æggene er svære at finde, og ungerne er svære at få til at vokse op.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates reticulatus* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**13-17 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri**
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**1-8**
Klækning	**10-14 dage**
Larvetid	**60-80 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Hele slægten Ranitomeya står på CITES liste II, så handel over EU's grænser kræver CITES-tilladelser, og du bør kunne dokumentere, at dyrene er opdrættede. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Et par *R. reticulata* kan holdes i et terrarie på 30 × 30 × 45 cm, der også rummer 2-3 dyr. Angivelserne går op til 40 × 40 × 40 cm til et par eller en trio, og et par er også holdt med god succes i 40 × 50 × 40 cm.

TEMPERATUR

Hold terrariet på 22-26 °C om dagen og 18-22 °C om natten. Arten trives bedst omkring 21-24 °C og tåler 18-27 °C, mens temperaturer over 29 °C kan være dødelige. Et par er holdt og har ynglet ved 22-26 °C i luft og vand.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING

Luftfugtigheden skal ligge på 70-100 %. En god rytme er næsten 100 % morgen og aften og 70-75 % midt på dagen, så terrariet tørrer lidt op mellem sprøjtningerne.

VAND OG VANDKVALITET

En lav vandskål eller en bromelie med vand i bladhjørnerne er nok.

LYS OG UVB

R. reticulata er dagaktiv, og lyset er først og fremmest til planterne. Giv 12-14 timers lys om dagen, fx LED fra kl. 8 til 20, og mørke om natten. Det er ikke dokumenteret, at arten har brug for UVB.

FODER

Grundfoderet er små leddyr. Unger og de fleste voksne tager flyveløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*), og store voksne kan også tage den større *D. hydei*.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

R. reticulata er lynhurtig og dristig og ses ofte frit fremme, som om den ikke aner, hvor lille den er. Hannerne kalder fra faste pladser med en høj, kort summen.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Peru og Ecuador.