herpy

PILEGIFTFRØER

Sira Poison Frog

Ranitomeya sirensis

Ranitomeya sirensis er en lille, dagaktiv pilegiftfrø på 15-25 mm fra det østlige Peru, det nordlige Bolivia og det vestligste Brasilien. Arten omfatter de former, der tidligere blev solgt som "lamasi" og "biolat", og de fleste af dem hører til de letteste pilegiftfrøer at få til at yngle. Frøerne trives i grupper, når der er plads nok.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Ranitomeya lamasi; Dendrobates lamasi; Dendrobates sirensis* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-25 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**I bladkar (fx bromelier)**
Kønsmoden	**5-8 mdr.**
Æg pr. lægning	**1-8**
Klækning	**10-14 dage**
Larvetid	**58-80 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Vogter æggene og bærer haletudserne**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**80-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri**
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Hele slægten Ranitomeya står på CITES liste II, så handel over EU's grænser kræver CITES-tilladelser, og du bør kunne dokumentere, at dyrene er opdrættede. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET	1-3 *R. sirensis* kan holdes i et terrarie på 45 × 45 × 45 cm, og et par eller en trio klarer sig også i 40 × 40 × 40 cm.
TEMPERATUR	Hold terrariet på 21-25 °C om dagen og 18-21 °C om natten. Arten tåler 18-27 °C, men trives bedst ved 21-24 °C, og temperaturer over 29 °C er farlige.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal ligge på 80-100 %. Arten tåler kun kortvarigt ned til 50 %, og kun hvis den har adgang til vand; lav fugt uden vand kan hurtigt blive dødelig.
VAND OG VANDKVALITET	En lav vandskål eller en bromelie med vand i bladhjørnerne er nok. Hold vandet 1-2 cm dybt, så den mindste frø kan sidde i det med hoved og overkrop over vandet.
LYS OG UVB	*R. sirensis* er dagaktiv, og lyset er først og fremmest til planterne. Giv 12-14 timers lys om dagen med lysstofrør eller LED og mørke om natten. Det er ikke dokumenteret, at arten har brug for UVB.
FODER	Grundfoderet er små leddyr: flyveløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*), springhaler og små bænkebidere. Voksne tager også den større *D. hydei* og nyklækkede fårekyllinger.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*R. sirensis* er ofte sky og gemmer sig gerne, så et tæt beplantet terrarie med mange gemmesteder giver mest at se til. Hannen kalder for at lokke en hun til et æglægningssted.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Bolivia, Brasilien og Peru.