herpy

PILEGIFTFRØER

Summers' Poison Dart Frog

Ranitomeya summersi

Ranitomeya summersi er en lille, dagaktiv pilegiftfrø på 16-21 mm fra Huallaga-dalen i Peru, orange eller kobberfarvet med sort marmorering og en sort maske over øjnene. Arten er truet i naturen, æggene er svære at finde, og frøerne er hurtige og sky, så den egner sig bedst til en holder med erfaring i pilegiftfrøer.

Familie: Dendrobatidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**16-21 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri**
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**4-9**
Klækning	**10-14 dage**
Larvetid	**60-80 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Vogter æggene og bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Truet (EN)**

Hele slægten Ranitomeya står på CITES liste II, så handel over EU's grænser kræver CITES-tilladelser, og du bør kunne dokumentere, at dyrene er opdrættede. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet. Arten er sjælden i naturen, og næsten alle dyr uden for Peru stammer fra ulovlig indsamling eller efterkommere af den, så kend dyrenes herkomst.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et par eller en lille trio af *R. summersi* kan holdes i et terrarie på mindst 30 × 30 × 45 cm (længde × bredde × højde), og større er bedre.

TEMPERATUR
Hold terrariet på 21-26 °C om dagen og 18-21 °C om natten. Arten trives bedst omkring 21 °C og kan overleve 18-27 °C. Temperaturer over 29 °C kan være dødelige.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING
Luftfugtigheden skal ligge på 70-100 %. En god rytme er tæt på 100 % morgen og aften og 70-75 % midt på dagen, så terrariet kan tørre lidt op mellem sprøjtningerne.

VAND OG VANDKVALITET
En lav vandskål eller en bromelie med vand i bladhjørnerne er nok.

LYS OG UVB
R. summersi er dagaktiv, og lyset er først og fremmest til planterne. Giv 12-14 timers lys om dagen og mørke om natten. Det er ikke dokumenteret, at arten har brug for UVB.

FODER
Grundfoderet er små levende leddyr. Unger og unge dyr tager flyveløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*), og store voksne kan også tage den større *D. hydei*.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
R. summersi er dagaktiv, hurtig og ofte sky, men kan blive dristigere, når den har vænnet sig til terrariet. Man ser mest til dem i et tæt beplantet terrarie med gemmesteder.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Peru.