herpy

PILEGIFTFRØER

Red Uakari Poison Frog

Ranitomeya uakarii

Ranitomeya uakarii er en meget lille, dagaktiv pilegiftfrø på 13-16 mm fra Amazonas-bækkenet. Den er sort med røde til orange striber, gule flanker og blå ben, og den er sjælden i hobbyen. Pasningen bygger på erfaringerne med slægten, og arten passer til en øvet holder med tålmodighed og en stabil forsyning af bittesmå foderdyr.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates uakarii* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**13-16 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-6 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri**
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**I bladkar (fx bromelier)**
Æg pr. lægning	**2-7**
Klækning	**10-14 dage**
Larvetid	**60-100 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Hele slægten Ranitomeya står på CITES liste II, så handel over EU's grænser kræver CITES-tilladelser, og du bør kunne dokumentere, at dyrene er opdrættede. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Et par eller en trio *Ranitomeya uakarii* kan holdes i et terrarie på 45 × 45 × 45 cm, og 40 × 40 × 40 cm bruges også til et par eller en trio. Tallene er lånt fra slægten, for artens pasning er ikke beskrevet særskilt.

TEMPERATUR

Hold terrariet på 21-25 °C om dagen og 18-21 °C om natten. Tallene er lånt fra slægten, og angivelserne svinger fra omkring 21-24 °C til 25-28 °C om dagen. Natten må gerne være op til omkring 5 grader køligere end dagen.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING

Luftfugtigheden skal ligge på 70-100 %. Sprøjt dagligt, så fugten er tæt på 100 % morgen og aften og 70-75 % midt på dagen. Så får terrariet lov at tørre lidt op mellem sprøjtningerne.

VAND OG VANDKVALITET

En lav vandskål eller en bromelie med vand i bladhjørnerne er nok. Hold vandet 1-2 cm dybt, så den lille frø kan sidde i det med hoved og overkrop over vandet; dybden er lånt fra slægten.

LYS OG UVB

Ranitomeya uakarii er dagaktiv, og lyset er først og fremmest til planterne. Giv 12-14 timers lys om dagen med lysstofrør eller LED og mørke om natten. Det er ikke dokumenteret, at arten har brug for UVB.

FODER

Grundfoderet er små leddyr: flyveløse bananfluer, springhaler, små hvide bænkebidere og nyklækkede fårekyllinger.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Ranitomeya uakarii er dagaktiv. I et tæt beplantet terrarie med mange gemmesteder ser du typisk mere til frøerne end i et goldt terrarie, men de små frøer er ofte sky og gemmer sig, når du kommer hen til glasset.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Brasilien, Colombia og Peru.