herpy

PILEGIFTFRØER

Brazilian Poison Frog

Ranitomeya vanzolinii

Ranitomeya vanzolinii er en lille, dagaktiv pilegiftfrø på 17-19 mm fra det vestlige Amazonas. Den lever i træerne og opdrætter sin yngel i vand, der samler sig i bromelier. Hunnen fodrer haletudserne med ufrugtbare æg.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates vanzolinii* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**17-19 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-6 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**I bladkar (fx bromelier)**
Æg pr. lægning	**1-6**
Klækning	**10-14 dage**
Larvetid	**60-80 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder og ufrugtbare æg fra hunnen**
Yngelpleje	**Bærer haletudserne og fodrer haletudserne med æg**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**23-26 °C**
Temperatur, nat	**19-23 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri**
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Hele slægten Ranitomeya står på CITES liste II, så handel over landegrænser kræver CITES-papirer, og sælgeren bør kunne dokumentere, at dyrene er opdrættede. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og nævnes derfor ikke.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et terrarie på 40 × 40 × 40 cm er minimum til et par *Ranitomeya vanzolinii*, og angivelserne går op til 50 × 50 × 50 cm.

TEMPERATUR
Dagtemperaturen skal ligge på 23-26 °C, og om natten sænkes den med 3-4 °C til 19-23 °C. Udsvinget over året skal være lille, 1-2 °C. Varmeplet er ikke nødvendig, og arten har ingen vinterhvile.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING
Luftfugtigheden skal være 70-100 %. Morgen og aften bør den ligge tæt på 100 %, og ved middagstid må den falde til 70-75 %. Terrariet sprøjtes dagligt, helst morgen og aften, med osmose- eller regnvand.

VAND OG VANDKVALITET
En vandskål er ikke nødvendig for de voksne dyr, men er en fordel, og den kan være lav med 1-2 cm vand.

LYS OG UVB
Lysbehovet for *Ranitomeya vanzolinii* er beskedent. Frøen har brug for lys nok til at se sin føde, og planterne har brug for mere. En LED-belysning til planter eller et lysstofrør, tændt 12-14 timer i døgnet, er passende.

FODER
Ranitomeya vanzolinii lever af små, levende leddyr: bananfluer, springhaler, små tropiske isopoder og nyklækkede fårekyllinger. Små dyr kræver små foderdyr.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Ranitomeya vanzolinii er dagaktiv, men sky. I et tæt beplantet terrarie med mange gemmesteder viser den sig oftere end i et sparsomt indrettet. Frøen har et trillende kald, som mest høres om morgenen og aftenen.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Brasilien og Peru.