herpy

PILEGIFTFRØER

Variable Poison Frog

Ranitomeya variabilis

Ranitomeya variabilis er en lille, dagaktiv pilegiftfrø på 15-20 mm fra Andes' østskråninger og Amazonas. Den har mange lokale former i gult, grønt og blåt med sort tegning, yngler i bromelier og er kendt for, at hannen bærer haletudserne rundt mellem plantens vandsamlinger. En god første art blandt de små pilegiftfrøer.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates variabilis* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-20 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri**
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**I bladkar (fx bromelier)**
Æg pr. lægning	**1-10**
Klækning	**10-14 dage**
Larvetid	**60-80 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder og andre haletudser**
Yngelpleje	**Bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Hele slægten Ranitomeya står på CITES liste II, så handel over EU's grænser kræver CITES-tilladelser, og du bør kunne dokumentere, at dyrene er opdrættede. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et par *R. variabilis* kan holdes i et terrarie på 40 × 40 × 40 cm, og samme størrelse passer til et par eller en trio af slægten. Til 2-3 voksne kan 30 × 30 × 45 cm også bruges, og hver ekstra frø bør have ca. 4 liter mere plads.

TEMPERATUR
Hold terrariet på 21-26 °C om dagen og 18-22 °C om natten. Arten trives bedst omkring 21 °C, tåler 18-27 °C og må aldrig komme over 29 °C.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING
Luftfugtigheden skal være 70-100 %. Sigt efter næsten 100 % morgen og aften og 70-75 % midt på dagen. Arten kan klare sig kortvarigt ved 50 %, hvis den har rent vand at sidde i, men det er en nødløsning.

VAND OG VANDKVALITET
Giv frøerne en lav vandskål eller et lille vandparti, og hold vandet så lavt, at den mindste frø kan sidde med hoved og overkrop over vandet; arten svømmer dårligt.

LYS OG UVB
Frøerne er dagaktive og lever i skovens skygge. Lyset er først og fremmest til planterne: LED-lys 12-14 timer om dagen er passende. Det er ikke dokumenteret, at arten har brug for UVB, og det bruges normalt ikke.

FODER
R. variabilis er så lille, at den kun kan tage små foderdyr: springhaler, flyveløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*) og små bænkebidere. Store voksne kan også tage *D. hydei*.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
R. variabilis er dagaktiv og fredelig. Hannerne kalder fra forhøjede pladser, og i naturen har arten et frit parringssystem uden faste par og uden forsvarede territorier.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Peru, Ecuador, Colombia, Brasilien og Fransk Guyana.