herpy

PILEGIFTFRØER

Amazonian Poison Frog

Ranitomeya ventrimaculata

Ranitomeya ventrimaculata er en lille, dagaktiv pilegiftfrø på under 18 mm fra regnskoven i det østlige Ecuador, det nordøstlige Peru og det sydøstlige Colombia. I snæver forstand er den sort med tynde lyserøde striber og blågråt netmønster på ben og bug. Navnet har i årtier dækket andre arter i hobbyen, så det er vigtigt at vide, hvad dyrene faktisk er.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates ventrimaculatus; Dendrobates minutus ventrimaculatus; Dendrobates duellmani; Ranitomeya duellmani* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-17 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri**
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. lægning	**1-4**
Larvetid	**60-80 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder og andre haletudser**
Yngelpleje	**Bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Hele slægten Ranitomeya står på CITES liste II, så handel over EU's grænser kræver CITES-tilladelser. Køb kun dyr, der kan dokumenteres som opdrættede, og gem papirerne. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Arten i snæver forstand er næsten ukendt i terrarier, og der findes ingen pasningserfaringer, der gælder netop den. Tallene her er de samme som for de andre små Ranitomeya.
TEMPERATUR	Hold terrariet på 21-26 °C om dagen og 18-22 °C om natten. Tallene gælder de små Ranitomeya generelt: de tåler omkring 18-27 °C og må aldrig komme over 29 °C.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal være 70-100 %: tæt på 100 % morgen og aften og 70-75 % midt på dagen. Små pilegiftfrøer kan klare kortvarigt fald til 50 %, hvis de har rent vand at sidde i, men det er en nødløsning.
VAND OG VANDKVALITET	Giv frøerne en lav vandskål eller et lille vandparti med 1-2 cm vand, så den mindste frø kan sidde med hoved og overkrop over vandet; de små pilegiftfrøer svømmer dårligt.
LYS OG UVB	Frøerne er dagaktive og lever i skovens skygge. Lyset er først og fremmest til planterne: 12-14 timer om dagen med LED-lys er almindeligt.
FODER	*Ranitomeya ventrimaculata* er så lille, at den kun kan tage små foderdyr: springhaler, flyveløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*), små tropiske bænkebidere og nyklækkede fårekyllinger. Store voksne kan tage *D. hydei*.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Ranitomeya ventrimaculata* er dagaktiv og lever mest i løvet på skovbunden. Hannerne kalder med en hurtig summen. Små Ranitomeya er ofte sky, men i et tæt beplantet terrarie ser man typisk mere til dem.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Ecuador, Peru og Colombia.