herpy

SALAMANDRE

Western Tiger Salamander

Ambystoma mavortium

Ambystoma mavortium er en kraftig, op til 30-35 cm lang salamander fra Nordamerikas prærier, skove og halvørkener, med gule tværbånd og pletter på mørk bund. Larverne lever i vand, mens de voksne tilbringer det meste af livet i selvgravede gange og kommer frem om natten. Nogle dyr forvandler sig aldrig og bliver kønsmodne med gællerne i behold.

Familie: Ambystomatidae Udgivet 16. november 2026

Mild hudgift

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-30 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Halvørken og tempereret skov og eng**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Begynder**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Larver i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**5-36 mdr.**
Æg pr. sæson	**100-1.000**
Klækning	**19-50 dage**
Larvetid	**75-150 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Andre larver og små vanddyr (dafnier, myggelarver)**
Yngelpleje	**Ingen**

PASNING

Min. terrarie	**50 × 25 × 30 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**18-22 °C**
Temperatur, nat	**16-20 °C**
Luftfugtighed	**80-95 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Ikke nødvendig**
Kost	**Insekter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES og står ikke i EU-bilag A-D. Den står ikke på listen over forbudte dyr i BEK nr. 1261/2015.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Voksne dyr kan holdes i mange slags beholdere.
TEMPERATUR	Temperaturen skal ligge på 18-22 °C om dagen og gerne lidt lavere om natten, både for larver og voksne. Arten tåler kulde bedre end varme. Larvebassinet opvarmes ikke, og vandet må ikke komme over 24 °C.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Underlaget skal være fugtigt, men aldrig vådt eller mudret, for dyret optager vand gennem huden og drikker ikke med munden. Luftfugtigheden er ikke målt for arten; et fugtigt underlag giver omkring 80-95 %.
VAND OG VANDKVALITET	En lav, tung vandskål er ikke nødvendig, men den er en god sikkerhed: bliver underlaget for tørt, søger dyret ned i skålen, så den forebygger dødsfald af udtørring.
LYS OG UVB	Arten er nataktiv og har ikke brug for særligt lys. Der er ingen viden om, at den har brug for UVB, og kraftigt UV-lys kan skade øjne og hud hos padder.
FODER	Larver og neotene dyr æder regnorme, kompostorme, passende store fårekyllinger, voksmøllarver og små fisk. Små stykker kød kan gives som en enkelt middag, men ikke som hovedfoder, fordi kød mangler vitaminer og mineraler.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Voksne dyr graver og ligger skjult det meste af dagen. De er nataktive og aktive jægere, som venter i baghold. Mange dyr lærer deres holder at kende og tigger mad. Arten er en enspænder uden for yngletiden og har det fint alene.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Canada, USA og Mexico.