herpy

SALAMANDRE

Marbled Salamander

Ambystoma opacum

Ambystoma opacum er en lille, tykkroppet salamander på 9-11 cm fra det østlige Nordamerika, sort med tværbånd af hvidt eller sølvgråt. Arten har en usædvanlig yngelbiologi: parringen og æglægningen foregår på land om efteråret, og hunnen bliver hos æggene, til regnen fylder lavningen og larverne klækker. De voksne lever skjult og trives bedst køligt.

Familie: Ambystomatidae Tidligere navn: *Salamandra armigera; Salamandra fasciata* **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**9-11 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**4-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Tempereret skov og eng**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Begynder**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Larver i vand**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**12-24 mdr.**
Æg pr. sæson	**50-200**
Lægninger pr. år	**1**
Larvetid	**60-270 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Andre larver og små vanddyr (dafnier, myggelarver)**
Yngelpleje	**Vogter æggene**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 25 × 25 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**18-24 °C**
Temperatur, nat	**16-20 °C**
Luftfugtighed	**80-95 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Ikke nødvendig**
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller i gruppe**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES og står ikke i EU's bilag A-D. Den står ikke på listen over forbudte dyr i bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015. Salamandre er omfattet af EU's dyresundhedsregler på grund af Bsal; tjek de aktuelle regler for handel og indførsel hos Fødevarestyrelsen.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Ambystoma opacum*, og rådene om underlag og vand er delvis lånt fra de nærtstående *Ambystoma maculatum* og *Ambystoma tigrinum*, som holdes langt oftere. Arten er mindre end begge.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 18-24 °C, og om natten må det gerne være et par grader køligere, 16-20 °C. Arten tåler kulde bedre end varme, og over 30 °C i længere tid kan den dø.
LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING	Underlaget skal være fugtigt, men aldrig vådt eller mudret, for dyret optager vand gennem huden. Et fugtigt underlag svarer til 80-95 % luftfugtighed. Forstøv underlaget med klorfrit vand, når overfladen ser tør ud.
VAND OG VANDKVALITET	Voksne dyr er dårlige svømmere, og arten drukner, hvis den ikke kan komme op af vandet. Dybe skåle og vandpartier skal derfor undgås. En vandskål må højst være 1-2 cm dyb og skal have sten eller bark, så dyret nemt kravler op igen.
LYS OG UVB	Arten er nataktiv og lever skjult, så den har ikke brug for særligt lys og heller ikke for UVB. UV-lys kan skade øjne og hud hos padder, og larver må ikke udsættes for det.
FODER	Voksne dyr æder krybende og flyvende insekter, orme og små snegle: fårekyllinger, regnorme og kompostorme, og lejlighedsvis voksmøllarver. Foderdyrene skal være mindre end dyrets hoved.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Voksne dyr ligger skjult det meste af tiden og kommer frem om natten for at jage. Arten bider ikke mennesker. Uden for yngletiden lever dyrene alene, og især hannerne bider hinanden i snuden, hvis de mødes.
OPRINDELIG UDBREDELSE	USA.