herpy

SALAMANDRE

Eastern Tiger Salamander

Ambystoma tigrinum

Ambystoma tigrinum er en kraftig salamander fra den østlige halvdel af USA på typisk 15-20 cm med gule til olivengrønne pletter på brun til sort bund. Larverne lever i vand, mens de voksne tilbringer det meste af livet i selvgravede gange og kommer frem om natten. Nogle dyr forvandler sig aldrig og bliver kønsmodne med gællerne i behold.

Familie: Ambystomatidae **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-33 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**12-20 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Tempereret skov og eng**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Begynder**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Larver i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**5-48 mdr.**
Æg pr. sæson	**100-1.000**
Klækning	**12-50 dage**
Larvetid	**75-150 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Andre larver og små vanddyr (dafnier, myggelarver)**
Yngelpleje	**Ingen**

PASNING

Min. terrarie	**50 × 25 × 30 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**18-22 °C**
Temperatur, nat	**16-22 °C**
Luftfugtighed	**80-95 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Ikke nødvendig**
Kost	**Insekter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES og står ikke i EU's bilag A-D. Den står ikke på listen over forbudte dyr i bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015. Salamandre er omfattet af EU's dyresundhedsregler på grund af Bsal; tjek de aktuelle regler for handel og indførsel hos Fødevarestyrelsen.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Voksne dyr kan holdes i mange slags beholdere.
TEMPERATUR	*Ambystoma tigrinum* skal have 18-22 °C om dagen, både som larve og som voksen, og om natten må temperaturen gerne falde til 16 °C. Arten tåler kulde bedre end varme. Larvebassinet opvarmes ikke, og vandet må ikke komme over 24 °C.
LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING	Underlaget skal være fugtigt, men aldrig vådt eller mudret, for dyret optager vand gennem huden. Luftfugtigheden er ikke dokumenteret for arten; 80-95 % er lånt fra *Ambystoma mavortium*. Det afgørende er fugten i underlaget.
VAND OG VANDKVALITET	Voksne dyr skal ikke have en vanddel: de er dårlige svømmere og kan drukne. En lav, tung vandskål er ikke nødvendig, men den er en god sikkerhed, for bliver underlaget for tørt, søger dyret ned i skålen.
LYS OG UVB	*Ambystoma tigrinum* er nataktiv og har ikke brug for særligt lys. Der er ingen viden om, at arten har brug for UVB, og kraftigt UV-lys kan skade øjne og hud hos padder.
FODER	Larver og neotene dyr æder regnorme, kompostorme, passende store fårekyllinger, voksmøllarver og små fisk (ikke guldfisk). Kød kan gives som en enkelt middag, men ikke som hovedfoder, fordi kød mangler vitaminer og mineraler.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Voksne dyr graver og ligger skjult det meste af dagen. De er nataktive og jager fra baghold. Mange dyr lærer deres holder at kende og tigger mad. Arten er en enspænder uden for yngletiden og har det fint alene.
OPRINDELIG UDBREDELSE	USA.