herpy

SALAMANDRE

Anderson's Crocodile Newt

Echinotriton andersoni

Echinotriton andersoni er en kompakt, mørkebrun til sort salamander på 14-21 cm fra de centrale Ryukyu-øer i Japan. Den lever mest på land i fugtig skov, har knopagtige vorter langs siderne og kan stikke ribbenenes spidser ud gennem huden som forsvar. Arten er sjælden og kun lidt kendt i terrarier.

Familie: Salamandridae Tidligere navn: *Pleurodeles andersoni; Tylototriton andersoni* **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**14-21 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Tørskov og vådområde**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Erfaren**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Larver i vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. sæson	**3-46**
Klækning	**20-27 dage**
Larvetid	**70-100 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Andre larver og små vanddyr (dafnier, myggelarver)**
Yngelpleje	**Ingen**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-25 °C**
Temperatur, nat	**15-20 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vanddel** dybde 10-20 cm
UVB	**Ikke nødvendig**
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Sårbar (VU)**

CITES III (opført af Japan) og EU's bilag C. Listningen omfatter levende dyr og æg, men ikke andre dele og afledte produkter. CITES-tilladelser og -certifikater udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Arten står ikke på listen over dyr, som private ikke må holde (BEK nr. 1261 af 17.11.2015). Bsal-regler for handel og indførsel: kontakt Fødevarestyrelsen.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Echinotriton andersoni*.
TEMPERATUR	Temperaturen er 18-25 °C om dagen og må gerne falde til 15-20 °C om natten. Den bør ikke ligge over 25 °C i længere tid. Varmelamper er unødvendige; hold terrariet køligt om sommeren og uden direkte sol.
LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING	Luftfugtigheden skal være 60-80 %. Løvlaget og jorden holdes fugtige, men ikke våde, og en del af underlaget skal være tørrere, så dyrene kan vælge. Sørg for lidt luftskifte, så luften ikke står stille.
VAND OG VANDKVALITET	Vandpartiet er en skålformet fordybning, omkring 30 cm i diameter og 10-20 cm dybt i midten, med en jævn skråning hele vejen rundt, så dyrene aldrig risikerer at drukne.
LYS OG UVB	Arten lever skjult og er mest aktiv i skumringen og om natten. UVB er ikke nødvendigt. En lysperiode på omkring 10 timer passer, og lyset skal også kunne holde planterne i live. Undgå direkte sol.
FODER	Dyrene tager regnorme, fårekyllinger, snegle, landisopoder og små biller. Regnorme og fårekyllinger er velegnede som hovedfoder, og foderdyrene skal være så store, at dyret kan sluge dem hele.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Dyret lever skjult og er mest fremme i skumringen og om natten. Grupper kræver rigeligt skjul. Dyret egner sig ikke til håndtering.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Japan.