herpy

SALAMANDRE

Chinhai Spiny Newt

Echinotriton chinhaiensis

Echinotriton chinhaiensis er en kritisk truet salamander, som kun findes i et lille område i Beilun-distriktet øst for Ningbo i Zhejiang i Kina. Æggene lægges på land ved små stillestående damme, og larverne lever i vandet i 58-88 dage. Arten bliver først kønsmoden efter omkring ti år og kan blive mindst 20 år gammel. Der findes næsten ingen viden om pasningen af de voksne dyr.

Familie: Salamandridae Tidligere navn: *Pleurodeles chinhaiensis; Tylototriton chinhaiensis* **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**14-21 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**20-25 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Vådområde og tempereret skov og eng**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Erfaren**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Larver i vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. sæson	**3-46**
Klækning	**29-31 dage** ved 20 °C
Larvetid	**58-88 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Andre larver og små vanddyr (dafnier, myggelarver)**
Yngelpleje	**Ingen**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-25 °C**
Temperatur, nat	**15-20 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vanddel** dybde 10-20 cm
UVB	**Ikke nødvendig**
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Kritisk truet (CR)**

CITES liste II og EU's bilag B. Handel inden for EU kræver dokumentation for dyrenes lovlige oprindelse, og CITES-tilladelser og -certifikater udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Arten står ikke på listen over dyr, som private ikke må holde (BEK nr. 1261 af 17.11.2015). Salamandre er omfattet af EU's dyresundhedsregler om Bsal; Fødevarestyrelsen kan oplyse om de aktuelle regler ved import og handel.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Echinotriton chinhaiensis*. De fleste undersøgelser handler om æg og larver.
TEMPERATUR	Temperaturen til voksne dyr er lånt fra *Echinotriton andersoni*: 18-25 °C om dagen og 15-20 °C om natten. Voksne dyrs krav er ikke undersøgt hos *Echinotriton chinhaiensis*.
LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING	Luftfugtigheden er lånt fra *Echinotriton andersoni*: 60-80 %. Løvlaget og jorden holdes fugtige, men ikke våde, og en del af underlaget skal være tørrere, så dyrene kan vælge. Æg på land skal ligge fugtigt hele tiden.
VAND OG VANDKVALITET	Vandpartiet er en skålformet fordybning, omkring 30 cm i diameter og 10-20 cm dybt i midten, med en jævn skråning hele vejen rundt, så dyrene ikke risikerer at drukne.
LYS OG UVB	UVB er ikke nødvendigt. Dyrene antages at være mest aktive i skumringen og om natten; det er lånt fra *Echinotriton andersoni*. En lysperiode på omkring 10 timer passer, og lyset skal også kunne holde planterne i live.
FODER	Voksnes føde er ikke dokumenteret. Hos *Echinotriton andersoni* er det regnorme, fårekyllinger, snegle, landisopoder og små biller, og foderdyrene skal kunne sluges hele.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	De voksnes adfærd er ikke dokumenteret. Larverne er forsigtige: de undgår synlige rovdyr og sætter aktiviteten ned, når de mærker rovdyr på lugten eller synet. Dyrene egner sig ikke til håndtering.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Kina.