herpy

SALAMANDRE

## Black-spotted Stout Newt

# *Pachytriton brevipes*

*Pachytriton brevipes* er en kraftig, glathudet og helt vandlevende salamander på 14-19 cm fra klare, kølige og hurtigt strømmende bjergbække i det sydøstlige Kina. Den er medium til mørkebrun med mange sorte pletter og en bred, årelignende hale. Den er territorial og aggressiv og kræver køligt, iltrigt vand.

Familie: Salamandridae  Udgivet 16. november 2026  **Mild hudgift**

### SPECIFIKATIONER

#### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **14-19 cm**<br>total længde inkl. hale |
| Levetid | **9-15 år** |
| Aktiv | **Skumring og nat** |
| Levevis | **Akvatisk** |
| Biotop | **Bjergskov og vådområde** |
| Hudgift | **Mild**<br>Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund |
| Sværhedsgrad | **Øvet** |

#### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **60 × 30 × 35 cm**<br>L × B × H til 2 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **14-18 °C** |
| Temperatur, nat | **12-16 °C** |
| Luftfugtighed | **70-90 %** |
| Vand | **Akvaterrarie**<br>dybde 20-25 cm |
| Vandtemperatur | **14-18 °C** |
| UVB | **Ikke nødvendig** |
| Kost | **Insekter, hvirveldyr og orme/snegle** |
| Holdes | **Enkeltvis eller i gruppe** |

#### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Udvikling | **Larver i vand** |
| Æglægning | **I vand** |
| Æg pr. sæson | **40** |
| Larvetid | **80-110 dage**<br>fra klækning til metamorfose |
| Larvefoder | **Små vanddyr (dafnier, myggelarver)** |
| Yngelpleje | **Vogter æggene** |

#### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ikke omfattet** |
| EU-bilag | **Ikke omfattet** |
| IUCN | **Ikke truet (LC)** |

Ikke omfattet af CITES eller EU's bilag A-D, og arten står ikke på listen over forbudte dyr (BEK nr. 1261/2015). Salamandre er omfattet af EU's dyresundhedsregler på grund af Bsal: tjek de aktuelle regler hos Fødevarestyrelsen før køb, salg og import.

## Pasning i korte træk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Der findes kun lidt viden om pasningen af *Pachytriton brevipes*, og meget af det, der er skrevet om slægten, bygger på handelsdyr, hvis art ikke er sikker. Arten lever i klare, kølige og iltrige bjergbække i det sydøstlige Kina. |
| **TEMPERATUR** | Vandet holdes under 18 °C, og kortvarigt tåles 21-24 °C; længere tid i varmt vand går ud over helbredet. |
| **LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING** | Luftfugtigheden spiller ingen rolle for et helt vandlevende dyr. I et lukket akvarium er den høj af sig selv; boksens 70-90 % er et skøn. Sørg for, at luften over vandet ikke bliver stående og varm. |
| **VAND OG VANDKVALITET** | Vandet skal være rent, iltrigt og i bevægelse. Et kraftigt filter (kassefilter, bundfilter eller indvendigt filter) er nødvendigt; svampefiltre og luftsten er mindre effektive og kræver hyppigere vandskift. |
| **LYS OG UVB** | UVB er ikke nødvendigt. Dyrene lever i skyggefulde bække, og lyset skal ikke være stærkt. Belysningen kan rettes efter eventuelle planter, og direkte sol undgås, fordi den varmer vandet. |
| **FODER** | Dyrene er glubske og æder orme, insekter, frosne røde myggelarver, oksehjerte, fisk, tørfoder i piller og små mængder magert kød. |
| **ADFÆRD OG HÅNDTERING** | *Pachytriton brevipes* er territorial og aggressiv. I næringsfattige bække bliver føden knap, og dyrene forsvarer derfor et område mod artsfæller. |
| **OPRINDELIG UDBREDELSE** | Kina. |

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/salamandre/pachytriton-brevipes