herpy

SALAMANDRE

Guizhou Warty Newt

Paramesotriton caudopunctatus

Paramesotriton caudopunctatus er en kraftig, næsten helt vandlevende salamander på op til 16 cm fra bjergskovene i det sydlige centrale Kina. Artsnavnet henviser til de små pletter på halen. Arten vokser usædvanligt langsomt, er sjælden i fangenskab og skal have køligt, rent vand.

Familie: Salamandridae Udgivet 16. november 2026 **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**13-16 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Akvatisk**
Biotop	**Regnskov, bjergskov og vådområde**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 30 × 35 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**16-22 °C**
Temperatur, nat	**14-18 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 15-20 cm
UVB	**Ikke nødvendig**
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Larver i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**108-120 mdr.**
Æg pr. sæson	**20-115**
Lægninger pr. år	**1**
Klækning	**21-56 dage** ved 18-25 °C
Larvetid	**80-110 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Andre larver og små vanddyr (dafnier, myggelarver)**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Næsten truet (NT)**

Hele slægten Paramesotriton står på CITES liste II (siden 2019) og i EU's bilag B (forordning 338/97). Handel inden for EU kræver dokumentation for dyrenes lovlige oprindelse, og indførsel fra lande uden for EU kræver tilladelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Ingen salamandre står på listen over dyr, som private ikke må holde (BEK nr. 1261 af 17.11.2015). Salamandre er omfattet af EU's dyresundhedsregler om Bsal; tjek de aktuelle regler hos Fødevarestyrelsen ved import eller handel.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Paramesotriton caudopunctatus*, og arten er sjælden i fangenskab.
TEMPERATUR	*Paramesotriton caudopunctatus* skal holdes køligt: 16-22 °C om dagen og 14-18 °C om natten, og vandet må ikke blive varmere end 22 °C.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	*Paramesotriton caudopunctatus* er næsten helt vandlevende, så luftfugtigheden spiller en lille rolle; 70-90 % er fint. En landdel skal være fugtig, så længe dyrene bruger den.
VAND OG VANDKVALITET	Vandet skal være 15-20 cm dybt. Brug afkloret postevand eller kildevand. Vandet skal være rent, og ekstreme værdier af pH og hårdhed undgås. Et svampefilter eller et lille indvendigt filter med svag strøm passer.
LYS OG UVB	*Paramesotriton caudopunctatus* behøver ikke kraftigt lys. Et enkelt lysstofrør eller LED-rør på en timer giver en fast døgnrytme på omkring 12 timer. UVB er ikke nødvendigt.
FODER	*Paramesotriton caudopunctatus* æder det samme som resten af slægten: hakkede regnorme, fårekyllinger, nyskallede melorme, kakerlakker og stykker af rejer. Voksne fodres to gange om ugen, unge 3-4 gange om ugen.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Paramesotriton caudopunctatus* er mere aktiv end de fleste arter i slægten. Unge landdyr er derimod meget skjulte og ses sjældent.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Kina.