herpy

SALAMANDRE

Guizhou Warty Newt

Paramesotriton caudopunctatus

Paramesotriton caudopunctatus er en kraftig, næsten helt vandlevende salamander på op til 16 cm fra bjergskovene i det sydlige centrale Kina. Artsnavnet henviser til de små pletter på halen. Arten vokser usædvanligt langsomt, er sjælden i fangenskab og skal have køligt, rent vand.

Familie: Salamandridae Udgivet 16. november 2026 **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**13-16 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Akvatisk**
Biotop	**Regnskov, bjergskov og vådområde**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 30 × 35 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**16-22 °C**
Temperatur, nat	**14-18 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 15-20 cm
UVB	**Ikke nødvendig**
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Larver i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**108-120 mdr.**
Æg pr. sæson	**20-115**
Lægninger pr. år	**1**
Klækning	**21-56 dage** ved 18-25 °C
Larvetid	**80-110 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Andre larver og små vanddyr (dafnier, myggelarver)**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Næsten truet (NT)**

Hele slægten Paramesotriton står på CITES liste II (siden 2019) og i EU's bilag B (forordning 338/97). Handel inden for EU kræver dokumentation for dyrenes lovlige oprindelse, og indførsel fra lande uden for EU kræver tilladelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Ingen salamandre står på listen over dyr, som private ikke må holde (BEK nr. 1261 af 17.11.2015). Salamandre er omfattet af EU's dyresundhedsregler om Bsal; tjek de aktuelle regler hos Fødevarestyrelsen ved import eller handel.

Om arten

Paramesotriton caudopunctatus er en kraftig salamander. Hunnerne bliver op til 16 cm i alt, og hannerne er som regel lidt kortere. Artsnavnet *caudopunctatus* betyder 'prikket hale' og henviser til pletterne på halen. Huden er kornet og brun, og bugen har orange til røde pletter som hos resten af slægten. Unger, der lever på land, er lidt mattere i farven end dyr i vandet.

Huden udskiller et sekret ved fare. Tetrodotoxin er påvist i huden hos flere arter i slægten, blandt andet *Paramesotriton chinensis* og *Paramesotriton deloustali*, men arten selv er ikke undersøgt, og hvor kraftigt sekretet virker på mennesker, er ikke kendt. Vask hænder efter kontakt, rør ikke øjne eller mund, og håndtér kun dyrene, når det er nødvendigt.

Arten blev beskrevet i 1973 af Liu og Hu. Den er en af de langsomst voksende arter i slægten: ungerne lever flere år på land og skal derefter vokse flere år i vandet, så der går omkring 10 år fra klækning til første æglægning. Levealderen er ikke dokumenteret; arter i slægten kan blive 10 år eller mere.

Udbredelse og levested

Paramesotriton caudopunctatus lever i det sydlige centrale Kina: det sydøstlige Chongqing, det sydvestlige Hunan, det østlige Guizhou og Fuchuan i det østlige Guangxi. Arten blev beskrevet fra Leigong Shan i Guizhou og findes i 500-1.800 meters højde.

> **Oprindelig udbredelse:** Kina.

LEVESTED

Paramesotriton caudopunctatus lever i skovklædte bjergområder i 500-1.800 meters højde, hvor den holder til i stille vand i og ved bjergbækkene. Klimaet er subtropisk med varme, regnfulde somre og kølige vintre, der er koldest i de højeste dele af udbredelsen. Døgn- og årstidsrytmen i naturen er ikke beskrevet nærmere. Arten er sårbar over for tab af levested.

Pasning

TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Paramesotriton caudopunctatus*, og arten er sjælden i fangenskab. Den holdes som *Paramesotriton hongkongensis*, som er langt bedre kendt, og tallene for akvarium, æg, klækning og larvetid er lånt derfra.

Et par skal have et akvarium på mindst 60 × 30 × 35 cm. En stor han kan stresse mindre hunner, så hold dyrene adskilt, eller del akvariet med en glasplade, hvis hunnerne ikke trives. Giv rigeligt skjul af sten, bark og rødder. Unge dyr, der endnu er landlevende, skal have en landdel af sten eller kork. Hold låget tæt.

Brug sand, store sten eller ingen bund. Fint grus kan sluges og give tarmslutning.

TEMPERATUR

Paramesotriton caudopunctatus skal holdes køligt: 16-22 °C om dagen og 14-18 °C om natten, og vandet må ikke blive varmere end 22 °C. Om sommeren kan det kræve ventilator, køleelementer eller et køligt rum at holde akvariet under grænsen. Vinterhvile er ikke dokumenteret for arten.

Læs mere: Vinterhvile og årstider

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING

Paramesotriton caudopunctatus er næsten helt vandlevende, så luftfugtigheden spiller en lille rolle; 70-90 % er fint. En landdel skal være fugtig, så længe dyrene bruger den.

Læs mere: Luftfugtighed, sprøjtning og ventilation

VAND OG VANDKVALITET

Vandet skal være 15-20 cm dybt. Brug afkloret postevand eller kildevand. Vandet skal være rent, og ekstreme værdier af pH og hårdhed undgås. Et svampefilter eller et lille indvendigt filter med svag strøm passer. Skift en del af vandet jævnligt, og fjern foderrester.

LYS OG UVB

Paramesotriton caudopunctatus behøver ikke kraftigt lys. Et enkelt lysstofrør eller LED-rør på en timer giver en fast døgnrytme på omkring 12 timer. UVB er ikke nødvendigt.

Læs mere: Lys og UVB

FODER

Paramesotriton caudopunctatus æder det samme som resten af slægten: hakkede regnorme, fårekyllinger, nyskallede melorme, kakerlakker og stykker af rejer. Voksne fodres to gange om ugen, unge 3-4 gange om ugen. Vænn dyrene til at tage foder fra en pincet. Unge landdyr æder små haveorme og små insekter; skift til hakkede regnorme, når de bliver større.

Læs mere: Foderdyr: hold og avl

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Paramesotriton caudopunctatus er mere aktiv end de fleste arter i slægten. Unge landdyr er derimod meget skjulte og ses sjældent. Forskel i størrelse kan give problemer: en stor han kan stresse hunnerne, så del akvariet med en glasplade, eller hold dyrene adskilt. Dyrene må ikke håndteres mere end nødvendigt; brug et net til flytning.

Avl

KØNSMODENHED OG KØNSBESTEMMELSE

Uden for yngletiden er kønnet svært at se. I yngletiden får hannen en opsvulmet kloak, og hunnen bliver fyldigere. Hunnerne bliver som regel lidt længere end hannerne, men en han kan godt være den største i en gruppe. Kønsmodenheden nås meget langsomt: dyrene når først yngelstørrelse efter flere års landliv og flere års vækst i vandet, i alt omkring 9-10 år. Tallet bygger på få dyr.

PARRING

Yngletiden er ikke dokumenteret for *Paramesotriton caudopunctatus*. Parringen følger formentlig slægtens mønster, hvor hannen puffer til hunnen, vifter med halen og afsætter en sædpakke, som hunnen samler op med kloakken. Dyr, der har været holdt adskilt, sættes sammen, når de har nået yngelstørrelse.

ÆG OG LARVER

Hunnen af *Paramesotriton caudopunctatus* lægger formentlig æggene enkeltvis på vandplanter som resten af slægten. Antallet pr. sæson er ikke dokumenteret for arten. Flyt æggene til en balje med luftsten, eller læg dem i et yngelnet.

METAMORFOSE

Æggene klækker efter 3-8 uger ved 18-25 °C, og larvetiden er 80-110 dage. Larverne kan æde hinanden, så sortér dem efter størrelse. Fodr dem dagligt med levende dafnier, myggelarver, enchytræer og nyklækkede artemia. Ved forvandlingen skrumper gællerne, og dyret går på land.

OPDRÆT AF UNGER

De nyforvandlede unger går på land og skal have en fugtig landdel eller en boks med fugtigt køkkenpapir og mos. De tager små haveorme, nyklækkede fårekyllinger og små insekter; skift til hakkede regnorme, når de bliver større. Ungerne er landlevende i flere år, men enkelte dyr bliver i vandet efter forvandlingen. Væksten er meget langsom, og ungerne gemmer sig så meget, at det er svært at se, om de æder. Et tæt låg er vigtigt, for ungerne slipper let ud.

Sundhed og typiske fejl

Typiske fejl og sygdomme hos *Paramesotriton caudopunctatus*:

- Varme og dårligt vand: hold temperaturen under 22 °C og vandet rent.
- Fint grus, der sluges og giver tarmslutning.
- Bsal (*Batrachochytrium salamandrivorans*): asiatiske salamandre kan bære svampen uden symptomer, og den kan være dødelig for andre halepadder. Nye dyr skal i karantæne, og udstyr og hænder skal rengøres mellem akvarier.
- Dyr, der ikke vil æde, har hudsår eller hævelser, skal til en dyrlæge med forstand på padder.

Læs mere: Karantæne og hygiejne

Spørg altid dine kloge bekendte

Vejledningen er et godt sted at begynde, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskellige, og meget af det vigtigste lærer man af dem, der har holdt arten i årevis. Tal med en avler, en erfaren holder eller en dyrlæge med forstand på krybdyr og padder, før du anskaffer dyret - og igen, hvis noget ser forkert ud.