herpy

SALAMANDRE

Hong Kong Warty Newt

Paramesotriton hongkongensis

Paramesotriton hongkongensis er en robust, næsten helt vandlevende salamander på 11-16 cm fra skovbækkene i Hongkong og det kystnære Guangdong. Den er brun med store orange til røde pletter på bugen og et hårdført, køleelskende akvariedyr, der vokser langsomt og skal have køligt, rent vand.

Familie: Salamandridae Udgivet 16. november 2026 **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**11-16 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Akvatisk**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 30 × 35 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-22 °C**
Temperatur, nat	**16-20 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 15-20 cm
UVB	**Ikke nødvendig**
Vinterhvile	**8-12 °C** 2-6 uger
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Larver i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**24-60 mdr.**
Æg pr. sæson	**20-115**
Lægninger pr. år	**1**
Klækning	**21-56 dage** ved 18-25 °C
Larvetid	**80-110 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Andre larver og små vanddyr (dafnier, myggelarver)**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Næsten truet (NT)**

Hele slægten Paramesotriton står på CITES liste II (arten siden 2017) og i EU's bilag B (forordning 338/97). Handel inden for EU kræver dokumentation for dyrenes lovlige oprindelse, og indførsel fra lande uden for EU kræver tilladelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Ingen salamandre står på listen over dyr, som private ikke må holde (BEK nr. 1261 af 17.11.2015). Salamandre er omfattet af EU's dyresundhedsregler om Bsal; tjek de aktuelle regler hos Fødevarestyrelsen ved import eller handel.

Om arten

Paramesotriton hongkongensis er en kraftig, tætbygget salamander på 11-16 cm i alt. Huden er fint kornet og olivenbrun til mørkebrun, og nogle dyr har en orange rygkam. Hovedet er trekantet, og rygkammen og kranieryggene er tydeligere end hos *Paramesotriton chinensis*, så dyret ser mere femkantet ud. Bugen og undersiden af halen har store, uregelmæssige orange til

røde pletter, og mønstret er unikt for hvert dyr. Halen er tynd og fladtrykt med en smal rød stribe langs undersiden. I parringstiden får hannen en hvid til blålig stribe langs halen og en opsvulmet kloak; hunnen er mere fyldig.

Når dyret er truet, udskiller huden et giftigt sekret, og det kan spille død ved at rulle om på ryggen og vise den farvestrålende bug. Hvor stærkt sekretet virker på mennesker, er ikke beskrevet. Vask hænder efter kontakt, rør ikke øjne eller mund, og håndtér kun dyrene, når det er nødvendigt.

Arten blev beskrevet i 1962 af George S. Myers og Alan E. Leviton. Den er undertiden regnet for en underart af *P. chinensis*, men den adskilte udbredelse og forskellene i udseende og levested taler imod, og den regnes i dag som selvstændig art.

I fangenskab er *P. hongkongensis* hårdfør og kan være akvatisk hele året, men den vokser langsomt. Størstedelen af slægtens dyr i handlen er vildtfangede. Arter i slægten kan blive 10 år eller mere i fangenskab; for netop denne art er levealderen ikke dokumenteret.

Udbredelse og levested

Paramesotriton hongkongensis lever i Hongkong, hvor den er den eneste halepadde, og i de kystnære dele af Guangdong-provinsen i Kina. Arten blev tidligere regnet for endemisk for Hongkong.

> **Oprindelig udbredelse:** SAR Hongkong og Kina.

LEVESTED

Paramesotriton hongkongensis lever i rolige pools i bække, der løber gennem bakket, subtropisk skov. Poolene er omkring 10-50 cm dybe og fyldt med nedfaldne blade, trærødder, sten og grus, som giver dyrene og deres bytte skjul. Efter sommerens regntid samles dyrene i poolene, og de yngler i vinterhalvåret. Angivelserne af yngletiden svinger fra september til april; æggene lægges især i februar og marts. Selv om arten er næsten helt vandlevende, går voksne dyr på land under kraftig regn, formentlig for at undgå oversvømmelser eller finde nye vande. Klimaet er subtropisk med varme, regnfulde somre og kølige, tørrere vintre.

Pasning

TERRARIET

Paramesotriton hongkongensis holdes i et akvarium på mindst 60 × 30 × 35 cm (omkring 60 liter) til et par. Hannerne kan være territoriale, men mindre end hos andre arter i slægten, og hunnerne kan være aggressive ved fodringen. Flere hanner kræver et større akvarium med mange skjul. Dyrene er sky og vil have skjul i form af sten, bark og planter og overhængende vegetation. En flydende kork-ø er et minimum af landdel; voksne dyr har ikke brug for meget land. Hold låget tæt, for dyrene kan forlade vandet.

Brug sand eller store sten som bund; fint grus kan sluges og give tarmslutning. Bunden skal vaskes grundigt og rengøres med en gruslugning ved hvert vandskifte. Kraftig beplantning med vandpest, sværdplanter og *Cabomba* giver skjul og æglæggeplads.

TEMPERATUR

Paramesotriton hongkongensis skal holdes køligt: 18-22 °C om dagen og 16-20 °C om natten, og vandet må ikke komme over 22 °C. Varme rum om sommeren kræver køling med ventilator, køleelementer eller placering i et køligt rum.

En egentlig vinterhvile er ikke nødvendig, og dyrene kan blive i vandet hele året. Et køligere rum om vinteren (10-15 °C) eller et par uger ved 8-10 °C fremmer yngletiden.

Læs mere: Vinterhvile og årstider

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING

Paramesotriton hongkongensis er vandlevende, så luftfugtigheden spiller en lille rolle; omkring 70-90 % i rummet er fint. En kork-ø eller landdel skal holdes fugtig, hvis dyrene bruger den.

Læs mere: Luftfugtighed, sprøjtning og ventilation

VAND OG VANDKVALITET

Vandet skal være cirka 15-20 cm dybt. Brug afkloret postevand eller kildevand. *Paramesotriton hongkongensis* er ikke kræsen med vandværdierne, så længe vandet er rent, og ekstreme værdier af pH og hårdhed undgås. Strøm er ikke nødvendig, men en svag bevægelse og en luftsten, der ilter vandet, er en fordel. Et svampefilter eller et lille indvendigt filter virker godt. Skift en del af vandet jævnligt, og fjern foderrester, så vandet holdes rent.

LYS OG UVB

Paramesotriton hongkongensis behøver ikke kraftigt lys. Et enkelt lysstofrør eller LED-rør i akvariets længde på en timer giver en fast døgnrytme på cirka 12 timer og er nok til planterne. UVB er ikke nødvendigt.

Læs mere: Lys og UVB

FODER

Paramesotriton hongkongensis æder det meste: hakkede regnorme, fårekyllinger, voksmøllarver, nyskallede melorme, kakerlakker, snegle, fluelarver og stykker af rejer samt færdigfoder til padder og vandskildpadder. Frosne myggelarver, dafnier og tubifex tages også. Voksne fodres hver 2-3 dag, unger hver 1-2 dag med mindre foderdyr som myggelarver, tubifex, enchytræer, hakkede regnorme og støvede små fårekyllinger. Med varieret kost er tilskud overflødigt. Vænn dyrene til at tage foder fra en pincet, så det er let at se, hvor meget hvert dyr æder, og vandet holdes renere.

Læs mere: Foderdyr: hold og avl

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Paramesotriton hongkongensis er sky i begyndelsen, men dyrene bliver ofte tillidsfulde og svømmer frem mod fronten, når der er mad. Hannerne kan være stridbare over for hinanden, især i yngletiden, og hunnerne kan slås om foderet. Dyrene må ikke håndteres mere end nødvendigt, fordi huden er halvgennemtrængelig. Brug et net til flytning.

Avl

KØNSMODENHED OG KØNSBESTEMMELSE

Uden for yngletiden er kønnet hos *Paramesotriton hongkongensis* svært at bestemme, fordi kloakken er næsten ens. Hunnen er ofte større, og halen kan være længere end kroppen, men det er ikke pålideligt. I yngletiden har hannen en hvid til blå halestribe og en opsvulmet kloak, og hunnen en mere vulkanformet kloak og en fyldigere krop. Kønsmodenheden nås langsomt, oftest efter 3-5 år; de første hanner kan vise yngletegn omkring 2 år gamle.

PARRING

Paramesotriton hongkongensis kan yngle uden køleperiode; et køligere rum om vinteren eller et par uger ved 8-10 °C fremmer yngletiden. Yngletiden ligger oftest fra december til marts. Hannen puffer blidt til hunnen, svømmer frem foran hende og vifter med halen. Puffer hunnen igen, vender hannen sig væk med halen i en S-form, går frem og afsætter en sædpakke, som hunnen samler op med kloakken.

ÆG OG LARVER

Hunnen af *Paramesotriton hongkongensis* lægger æggene enkeltvis på planteblade og folder dem ind i bladet. Æglægningen strækker sig over flere uger. Antallet er lavere end hos *Triturus* og *Cynops*, men en hun kan lægge op til 115 æg i løbet af en sæson. Æggene er store; kapslen måler 4,5-6 mm. Flyt æggene til en balje med luftsten, og skift vandet hver anden dag, eller læg dem i et yngelnet i akvariet. Hunnerne lægger helst på vandpest og sværdplanter.

METAMORFOSE

Æggene af *Paramesotriton hongkongensis* klækker efter 3-8 uger ved 18-25 °C, hurtigere jo varmere. Larverne er 10-14 mm og store nok til at tage dafnier og myggelarver fra starten. Giv dem levende dafnier, enchytræer, tubifex, nyklækkede artemia, tanglopper og hakkede orme, og læg planter ud som skjul. Larverne kan æde hinanden, så sortér efter størrelse. Forvandlingen sker efter cirka tre måneder og senest før vinteren, når larverne er 40-44 mm. Inden da bliver hovedet bredere og fladere, halen tyndere, gællerne skrumper, de gule dele bliver næsten sorte, og de første orange pletter viser sig på bugen. Lige før larven går på land, skifter den hud.

OPDRÆT AF UNGER

De nyforvandlede unger af *Paramesotriton hongkongensis* forlader vandet og flyttes til en boks med fugtigt køkkenpapir og mos eller til et terrarie med jord dækket af visne blade. De kan også opdrættes halvt i vand på grus med en lavvandet del. Giv adgang til vand: ungerne vender tilbage til vandet, når de er omkring to år gamle. Fodr dem med nyklækkede fårekyllinger,

hvide tropiske bænkebidere, små regnorme og myggelarver. Væksten er langsom, og enkelte dyr dør i tiden omkring forvandlingen.

Sundhed og typiske fejl

Typiske fejl og sygdomme hos *Paramesotriton hongkongensis*:

- Varme og dårligt vand: hold temperaturen under 22 °C og vandet rent.
- Fint grus, der sluges og giver tarmslutning.
- Bsal (*Batrachochytrium salamandrivorans*): asiatiske salamandre kan bære svampen uden symptomer, og den kan være dødelig for andre halepadder. Nye dyr skal i karantæne, og udstyr og hænder skal rengøres mellem akvarier.
- Dyr, der ikke vil æde, har hudsår eller hævelser, skal til en dyrlæge med forstand på padder.

Læs mere: Karantæne og hygiejne

Spørg altid dine kloge bekendte

Vejledningen er et godt sted at begynde, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskellige, og meget af det vigtigste lærer man af dem, der har holdt arten i årevis. Tal med en avler, en erfaren holder eller en dyrlæge med forstand på krybdyr og padder, før du anskaffer dyret - og igen, hvis noget ser forkert ud.