herpy

SALAMANDRE

Paddle Tail Newt

Paramesotriton labiatus

Paramesotriton labiatus er en næsten helt vandlevende salamander, der kun kendes fra Dayao-bjergene i Guangxi i det sydlige Kina. Arten er kritisk truet, og der findes næsten ingen viden om dens pasning. Den forveksles ofte, for de salamandre, der i handelen bærer navnet *labiatus*, hører til slægten *Pachytriton*.

Familie: Salamandridae Tidligere navn: *Pachytriton labiatus; Paramesotriton ermizhaoi* Udgivet 16. november 2026

Mild hudgift

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**11-16 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Akvatisk**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 30 × 35 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**16-22 °C**
Temperatur, nat	**14-18 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 15-20 cm
UVB	**Ikke nødvendig**
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Larver i vand**
Æglægning	**I vand**
Æg pr. sæson	**20-115**
Larvetid	**80-110 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Andre larver og små vanddyr (dafnier, myggelarver)**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Kritisk truet (CR)**

Hele slægten Paramesotriton står på CITES liste II (siden 2019) og i EU's bilag B (forordning 338/97). Handel inden for EU kræver dokumentation for dyrenes lovlige oprindelse, og indførsel fra lande uden for EU kræver tilladelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Ingen salamandre står på listen over dyr, som private ikke må holde (BEK nr. 1261 af 17.11.2015). Salamandre er omfattet af EU's dyresundhedsregler om Bsal; tjek de aktuelle regler hos Fødevarestyrelsen ved import eller handel.

Om arten

Paramesotriton labiatus er en af de mindst kendte arter i slægten. Som de øvrige *Paramesotriton* har den mørk ryg og orange tegninger på undersiden, men huden er forholdsvis glat. Mål og vægt er ikke dokumenteret.

Taksonomien har en lang og forvirrende historie. Arten blev beskrevet i 1930 som *Molge labiatum* ud fra dyr fra Yaoshan i Guangxi og blev senere ført i slægten *Pachytriton*. Under det navn blev en helt anden salamander kendt i handelen i mange år. I 2011 blev det klarlagt, at typeeksemplarerne slet ikke er *Pachytriton*, men en *Paramesotriton*, og at de er samme art som *Paramesotriton ermizhaoi*, der blev beskrevet fra Guangxi i 2009. Navnet *labiatus* blev derfor flyttet til *Paramesotriton*, og *P. ermizhaoi* er i dag et synonym. De dyr, der tidligere gik under navnet *Pachytriton labiatus*, hører nu til *Pachytriton granulosus* og *Pachytriton inexpectatus*. Salamandre, der sælges som *labiatus* eller under handelsnavnet 'paddletail', er derfor næsten altid *Pachytriton*-arter med andre behov og ikke denne art.

Arten er formentlig nærmest beslægtet med *Paramesotriton hongkongensis* og *Paramesotriton chinensis*. Hudgiften er ikke undersøgt hos selve arten, men tetrodotoxin er påvist i huden hos flere arter i slægten, blandt andet *Paramesotriton chinensis* og *Paramesotriton deloustali*. Vask hænder efter kontakt, rør ikke øjne eller mund, og håndtér kun dyrene, når det er nødvendigt.

Udbredelse og levested

Paramesotriton labiatus kendes kun fra Dayao-bjergene (Dayaoshan) i det centrale Guangxi i det sydlige Kina, hvor arten også blev beskrevet fra. Udbredelsen er meget lille, og højden over havet er ikke dokumenteret. Ældre angivelser fra Anhui, Zhejiang, Hunan, Guizhou og Guangdong gælder *Pachytriton*-arter, og mange fund under navnet stammer derfra.

> **Oprindelig udbredelse:** Kina.

LEVESTED

Levestedet for *Paramesotriton labiatus* er ikke beskrevet i detaljer. Arten lever i et skovklædt bjergmassiv med subtropisk, monsunpræget klima: varme, regnfulde somre og kølige vintre. Den er knyttet til vand, men om den foretrækker bække eller stille vand, er ikke kendt. Arten er en gammel, selvstændig linje i slægten, og den lille udbredelse på et enkelt bjergmassiv gør den sårbar over for forstyrrelser af levestedet.

Pasning

TERRARIET

Der findes næsten ingen viden om pasningen af *Paramesotriton labiatus*. Pasningen bygger på slægten og på den nære slægtning *Paramesotriton hongkongensis*, som er langt bedre kendt; tallene for størrelse, akvarium, temperatur og avl i boksen er lånt derfra. *Paramesotriton chinensis* har samme krav. Råd om de *Pachytriton*-arter, der sælges under navnet *labiatus*, gælder ikke for denne art.

Et par skal have et akvarium på mindst 60 × 30 × 35 cm. Hannerne i slægten kan være territoriale, især i yngletiden, så giv mange skjul af sten, bark og planter, og hold dyrene adskilt, hvis de bider hinanden. En flydende kork-ø eller en lille landdel er nok til voksne dyr. Hold låget tæt, for dyrene kan forlade vandet.

Brug sand, store sten eller ingen bund. Fint grus kan sluges og give tarmslutning.

TEMPERATUR

Paramesotriton labiatus skal holdes køligt som resten af slægten: 16-22 °C om dagen og 14-18 °C om natten, og vandet må ikke blive varmere end 22 °C. Om sommeren kan det kræve ventilator, køleelementer eller et køligt rum at holde akvariet under grænsen. Vinterhvile er ikke dokumenteret for arten.

Læs mere: Vinterhvile og årstider

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING

Paramesotriton labiatus lever næsten hele tiden i vandet, så luftfugtigheden spiller en lille rolle; 70-90 % i rummet er fint. En kork-ø eller landdel skal holdes fugtig, hvis dyrene bruger den. Sprøjtning er ikke nødvendig.

Læs mere: Luftfugtighed, sprøjtning og ventilation

VAND OG VANDKVALITET

Vandet skal være 15-20 cm dybt. Brug afkloret postevand eller kildevand. Vandet skal være rent og iltrigt, og ekstreme værdier af pH og hårdhed undgås. Et svampefilter eller et lille indvendigt filter med svag strøm og en luftsten passer. Skift en del af vandet jævnligt, og fjern foderrester.

LYS OG UVB

Paramesotriton labiatus behøver ikke kraftigt lys. Et enkelt lysstofrør eller LED-rør på en timer giver en fast døgnrytme på omkring 12 timer. UVB er ikke nødvendigt.

Læs mere: Lys og UVB

FODER

Paramesotriton labiatus er et rovdyr. Slægtens arter tager villigt hakkede regnorme, fårekyllinger, nyskallede melorme, kakerlakker, voksmøllarver og stykker af rejer samt frosne myggelarver og færdigfoder til padder og vandskildpadder. Voksne fodres to gange om ugen, unge 3-4 gange om ugen. Vænn dyrene til at tage foder fra en pincet, så det er let at se, hvor meget hvert dyr æder, og vandet holdes renere. Med varieret kost er tilskud overflødigt.

Læs mere: Foderdyr: hold og avl

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Adfærden hos *Paramesotriton labiatus* er ikke beskrevet. Slægtens arter er sky i begyndelsen, men bliver ofte tillidsfulde og svømmer frem mod fronten, når der er mad. Hannerne kan være stridbare, især i yngletiden, og hunnerne kan slås om foderet. Dyrene må ikke håndteres mere end nødvendigt, fordi huden er halvgennemtrængelig. Brug et net til flytning.

Avl

KØNSMODENHED OG KØNSBESTEMMELSE

Kønsforskelle og alder ved kønsmodenhed er ikke dokumenteret for *Paramesotriton labiatus*. Hos slægtens øvrige arter får hannen i yngletiden en lys stribe langs halen og en opsvulmet kloak, mens hunnen bliver fyldigere. Arterne vokser langsomt og bliver tidligst kønsmodne efter omkring 2 år, oftest efter 3-5 år.

PARRING

Parringen er ikke beskrevet for *Paramesotriton labiatus*. Hos slægten puffer hannen til hunnen, svømmer frem foran hende og vifter med halen, hvorefter han afsætter en sædpakke, som hunnen samler op med kloakken. Hos de bedre kendte arter fremmer en køligere periode om vinteren yngletiden. Giv mange skjul, så hunnen kan trække sig fra hannen.

ÆG OG LARVER

Æglægningen er ikke dokumenteret for *Paramesotriton labiatus*. Slægtens hunner lægger æggene enkeltvis på vandplanter og folder bladet om dem. Flyt æggene til en balje med luftsten, eller læg dem i et yngelnet, og skift vandet jævnligt.

METAMORFOSE

Klæktid og larvetid er ikke dokumenteret for arten. Hos slægten klækker æggene efter 3-8 uger, og larverne forvandles efter omkring tre måneder. Larverne er rovdyr og tager dafnier og myggelarver fra starten. Sortér dem efter størrelse, så de ikke æder hinanden. Ved forvandlingen skrumper gællerne, og dyret går på land.

OPDRÆT AF UNGER

Opdræt af *Paramesotriton labiatus* er ikke beskrevet. Hos slægten går de nyforvandlede unger på land og skal have en fugtig landdel eller en boks med fugtigt køkkenpapir og mos. De tager nyklækkede fårekyllinger, små regnorme og andre små foderdyr og vender først tilbage til vandet efter et eller flere år. Væksten er langsom.

Sundhed og typiske fejl

Typiske problemer hos *Paramesotriton labiatus*:

- Varme og dårligt vand: hold temperaturen under 22 °C og vandet rent.
- Bidsår, når dyrene slås: skil dem ad.
- Svampe- og bakterieinfektioner: hvide, luftige belægninger, rødme, hævelser eller sår, ofte som følge af dårligt vand eller stress.
- Fint grus, der sluges og giver tarmslutning.
- Bsal (*Batrachochytrium salamandrivorans*): asiatiske salamandre kan bære svampen uden symptomer, og den kan være dødelig for andre halepadder. Nye dyr skal i karantæne, og udstyr og hænder skal rengøres mellem akvarier.

Dyr, der ikke vil æde, har hudsår eller hævelser, skal til en dyrlæge med forstand på padder.

Læs mere: Karantæne og hygiejne

Spørg altid dine kloge bekendte

Vejledningen er et godt sted at begynde, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskellige, og meget af det vigtigste lærer man af dem, der har holdt arten i årevis. Tal med en avler, en erfaren holder eller en dyrlæge med forstand på krybdyr og padder, før du anskaffer dyret - og igen, hvis noget ser forkert ud.