herpy

SALAMANDRE

Rough-skinned Newt

Taricha granulosa

Taricha granulosa er en 13-22 cm lang vandsalamander fra Nordamerikas stillehavskyst, med mørk, grynet ryg og skarpt orange bug. Huden indeholder tetrodotoxin, en af de kraftigste gifte hos padder, og dyret er dødeligt giftigt, hvis det sluges. Arten skifter mellem vand og land, kan holdes i vand hele året og skal holdes køligt.

Familie: Salamandridae Tidligere navn: *Salamandra granulosa; Triturus granulosus; Triturus similans* **Kraftig hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**13-22 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**12-18 år**
Aktiv	**Dag og nat**
Levevis	**Semi-akvatisk**
Biotop	**Vådområde og tempereret skov og eng**
Hudgift	**Kraftig** Undgå hudkontakt, og vask hænderne grundigt efter arbejde i terrariet
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 30 × 40 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-21 °C**
Temperatur, nat	**14-18 °C**
Luftfugtighed	**80-95 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 20-30 cm
UVB	**Ikke nødvendig**
Kost	**Insekter, færdigfoder og orme/snegle**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Larver i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**48-60 mdr.**
Æg pr. sæson	**7-30**
Klækning	**21-42 dage**
Larvetid	**60-150 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Små vanddyr (dafnier, myggelarver)**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES og står ikke i EU-bilag A-D. Den står ikke på listen over forbudte dyr i BEK nr. 1261/2015.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Taricha granulosa er den mest vandlevende art i slægten. Dyrene skifter mellem land og vand, nogle i måneder eller år ad gangen, men fra omkring et års alderen kan de holdes i vand hele året.

TEMPERATUR
Taricha granulosa er køleelskende. Om sommeren holdes vand og luft på 18-21 °C. Bliver det varmere, op mod 24 °C, søger dyrene op på land; længere perioder over 21 °C bør undgås.

LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING
Landdelen og skjulene over vandet skal være fugtige, men ikke drivvåde. Luftfugtigheden er ikke målt for arten; et akvaterrarie med låg og fugtige skjul giver omkring 80-95 %. God ventilation forebygger hudinfektioner.

VAND OG VANDKVALITET
Vandet skal være 20-30 cm dybt, og dybere vand skader ikke: det er næsten umuligt at give arten for dybt vand i et almindeligt akvarium.

LYS OG UVB
Arten har ikke brug for UVB. Almindeligt dagslys i rummet eller et svagt lysstofrør om dagen og mørke om natten er nok. Akvariet må ikke stå i direkte sol, og varmelamper skal undgås.

FODER
Taricha granulosa er et opportunistisk rovdyr. I naturen æder den tanglopper, insekter, snegle, igler, haletudser og padde- og fiskeæg.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Aktiviteten varierer: nogle dyr er fremme om dagen, andre gemmer sig under rødder og sten og jager om natten. I yngletiden holder hannen fast om hunnen i parringsgrebet, som kan vare fra timer til flere dage.

OPRINDELIG UDBREDELSE
USA og Canada.