herpy

SALAMANDRE

## California Newt

# *Taricha torosa*

*Taricha torosa* er en kraftig, 13-20 cm lang vandsalamander fra Californiens kyst, med grynet brun ryg og gul til orange bug. Huden indeholder tetrodotoxin, en nervegift uden modgift, og dyret kan være dødeligt, hvis det sluges. Arten lever mest på land og søger kun i vand for at yngle, og den skal holdes køligt.

Familie: Salamandridae  Tidligere navn: *Cynops torosus; Notophthalmus torosus*  **Kraftig hudgift**

### SPECIFIKATIONER

#### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **13-20 cm**<br>total længde inkl. hale |
| Levetid | **12-22 år** |
| Aktiv | **Dag og nat** |
| Levevis | **Semi-akvatisk** |
| Biotop | **Vådområde og tempereret skov og eng** |
| Hudgift | **Kraftig**<br>Undgå hudkontakt, og vask hænderne grundigt efter arbejde i terrariet |
| Sværhedsgrad | **Øvet** |

#### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **60 × 30 × 30 cm**<br>L × B × H til 2 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **16-21 °C** |
| Temperatur, nat | **14-18 °C** |
| Luftfugtighed | **70-90 %** |
| Vand | **Vandskål** |
| UVB | **Ikke nødvendig** |
| Kost | **Insekter og orme/snegle** |
| Holdes | **Parvis eller i gruppe** |

#### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Udvikling | **Larver i vand** |
| Æglægning | **I vand** |
| Kønsmoden | **36 mdr.** |
| Æg pr. sæson | **7-30** |
| Klækning | **14-21 dage** |
| Larvetid | **60-90 dage**<br>fra klækning til metamorfose |
| Larvefoder | **Små vanddyr (dafnier, myggelarver)** |
| Yngelpleje | **Ingen** |

#### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ikke omfattet** |
| EU-bilag | **Ikke omfattet** |
| IUCN | **Næsten truet (NT)** |

Arten er ikke opført på CITES og står ikke i EU-bilag A-D. Ingen padder står på listen over forbudte dyr i BEK nr. 1261/2015.

## Pasning i korte træk

**TERRARIET**
Der findes forholdsvis lidt viden om pasningen af *Taricha torosa*, så vintertemperaturerne er lånt fra den nærtbeslægtede *Taricha granulosa*, som holdes oftere.

**TEMPERATUR**
*Taricha torosa* er køleelskende. Om dagen skal temperaturen være 16-21 °C og om natten 14-18 °C. Temperaturen må ikke komme over 24 °C, og længere perioder over 21 °C skal undgås.

**LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING**
Underlaget skal være fugtigt, men terrariet skal ikke dryppe. Luftfugtigheden ligger på omkring 70-90 %, og daglig forstøvning med afkloret vand holder underlaget fugtigt.

**VAND OG VANDKVALITET**
En lav skål med rent vand skal altid stå fremme, så dyret kan dække sig helt med vand. Brug postevand, der er behandlet mod klor og kloramin; destilleret og demineraliseret vand bruges ikke.

**LYS OG UVB**
Arten har ikke brug for UVB. Dagslys i rummet eller et svagt lysstofrør om dagen og mørke om natten er nok. Terrariet må ikke stå i direkte sol, og varmelamper skal undgås, fordi arten ikke tåler varme.

**FODER**
*Taricha torosa* er et opportunistisk rovdyr, der tager næsten alt, hvad den kan overmande. Regnorme er en hel kost i sig selv, og også kompostorme (*Eisenia fetida*) bliver taget villigt.

**ADFÆRD OG HÅNDTERING**
*Taricha torosa* er rolig, selskabelig og ikke aggressiv over for artsfæller af samme størrelse. I yngletiden bliver hannerne mere aggressive over for hinanden, og der dannes store kugler af dyr omkring en parringsklar hun.

**OPRINDELIG UDBREDELSE**
USA.