herpy

SALAMANDRE

Pygmy Marbled Newt

Triturus pygmaeus

Triturus pygmaeus er en vandsalamander fra den sydvestlige del af Den Iberiske Halvø og den mindste art i slægten med 10-13 cm i alt. Den kendes på det grønne, sort marmorerede mønster, den tynde orange rygstribe og den lyse bug med mørke pletter. Arten er køleelskende og trives i et køligt akvaterrarie med vandplanter og gode skjul.

Familie: Salamandridae **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**10-13 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-25 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende og semi-akvatisk**
Biotop	**Vådområde og tempereret skov og eng**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 30 × 30 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**12-20 °C**
Temperatur, nat	**8-15 °C**
Luftfugtighed	**70-95 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 10-25 cm
UVB	**Ikke nødvendig**
Vinterhvile	**6-10 °C** 6-10 uger
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Larver i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**24-36 mdr.**
Æg pr. sæson	**200-350**
Klækning	**14-21 dage** ved 12-15 °C
Larvetid	**56-70 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Små vanddyr (dafnier, myggelarver)**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Næsten truet (NT)**

Arten står ikke på CITES-listerne eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Den står ikke på listen over dyr, som private ikke må holde (BEK nr. 1261 af 17.11.2015). Bsal-regler for handel og indførsel: kontakt Fødevarestyrelsen.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Triturus pygmaeus kan holdes året rundt i et akvaterrarie, og mange dyr bliver gerne i vandet, når de er voksne. Et anlæg på 60 × 30 × 30 cm passer til to dyr, og et større giver mere ro.

TEMPERATUR

Triturus pygmaeus er køleelskende. Dagtemperaturen er 12-20 °C og nattemperaturen 8-15 °C. Temperaturer over 22 °C i længere tid skal undgås, for dyrene bliver sløve og får dårlig appetit.

LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING

Huden tørrer hurtigt ud, så luftfugtigheden over landdelen skal være 70-95 %. Forstøv landdelen med afkloreret vand en til to gange dagligt, og lad mos og jord holde på fugten, uden at underlaget bliver gennemvædet.

VAND OG VANDKVALITET

Vanddelen er 10-25 cm dyb og 10-20 °C varm. Afkloreret postevand, som har stået nogle dage, passer fint, for kloren skal være væk, men vandkvaliteten er ellers ikke kritisk.

LYS OG UVB

UVB er ikke nødvendigt for arten, der lever skjult og er nataktiv. Almindeligt LED-lys i 10-12 timer om dagen giver vandplanterne det, de skal bruge, og mere lys og højere temperatur i foråret hjælper dyrene i yngleform.

FODER

Triturus pygmaeus er grådig og æder alle små dyr, den kan sluge. I vandet får den regnorme, myggelarver, tubifex, dafnier, rejer og tørfoder fra bunden; bløddyr og små fisk tages også.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Arten er rolig og kan holdes parvis eller i en lille gruppe. I yngletiden er en gruppe med flere hunner end hanner et godt valg, så hunnerne får ro.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Portugal og Spanien.